

Guide d'enseignement



**Pour les usagers porteurs d'un
cathéter central inséré
par voie périphérique (CCIVP) Picc-Line**

Cathéter central inséré par voie périphérique (CCIVP)

Le CCIVP est un accès veineux central inséré dans la veine d'un membre supérieur. Il permet d'administrer des médicaments directement dans les veines (ex. : soluté, chimiothérapie, antibiotiques, alimentation intraveineuse, etc.).

L'installation a lieu au département de radiologie. À la suite d'une anesthésie locale de la peau, le cathéter est inséré sous échographie.

Cathéter installé le : _____

Type de cathéter

- CCIVP (Picc-Line) avec valve
- CCIVP (Picc-Line) sans valve
- Autre : _____

Mesure du cathéter

- Mesure interne : _____
- Mesure externe : _____

Fréquence de changement du pansement

- Premier changement dans 24 h, soit le : _____
- Puis, à raison **d'une fois par semaine**, une infirmière du CLSC prendra rendez-vous avec vous pour changer le pansement.

Signes et symptômes à surveiller

Vérifiez, **au moins une fois par jour** :

- s'il y a apparition de rougeur, de chaleur, de douleur ou d'un gonflement le long du trajet du cathéter au-dessus du pli du coude;
- s'il y a un écoulement de liquide sous le pansement au pli du coude;
- l'état du pansement à l'endroit où est installé le cathéter (site), c'est-à-dire s'il est étanche;
- s'il y a présence de sang dans la tubulure de rallonge ou de la rougeur sous le pansement;
- s'il y a apparition de démangeaisons, de petits boutons sous le pansement;
- si vous vous administrez de la médication intraveineuse, assurez-vous de bien désinfecter et irriguer chaque voie selon la technique enseignée avant et après votre médication (assurez-vous qu'il y a absence de résistance lors de l'irrigation).

IMPORTANT | En présence d'un de ces signes ou de symptômes, communiquez sans délai avec la ligne dédiée.

Ligne dédiée : 1 888 939-5050
24 heures sur 24 ● 7 jours sur 7

Conseils lors de vos activités quotidiennes

- Laissez votre bras au repos le plus possible et évitez de faire des mouvements et des activités brusques, tels que tondre le gazon, soulever des poids lourds, faire du ménage, pratiquer des sports, pêcher, etc. pour diminuer les risques de complications.
- Évitez d'exercer une pression sur la portion du bras au-dessus du pli du coude (ex.: porter des vêtements à manches trop serrées).
- Évitez de mouiller votre cathéter (baignade). Nous vous conseillons de mettre une pellicule de plastique (de type « saran wrap ») ou un sac de plastique fixé avec des rubans adhésifs aux 2 extrémités lors du bain ou de douche.
- Pour éviter que le cathéter se bloque entre les utilisations, celui-ci doit être irrigué toutes les semaines par une infirmière du CLSC;
- Une carte d'identification comprenant des informations relatives à votre cathéter vous sera remise (apportez-la toujours avec vous).

