


Guide d'enseignement



**Pour les usagers porteurs d'un
dispositif d'accès vasculaire implantable
(DAVI) (Port-a-Cath)**

Dispositif d'accès vasculaire implantable (DAVI) (Port-a-Cath)

La chambre implantable est un système composé d'un boîtier muni d'un réservoir. Il est fixé sous la peau lors d'une intervention chirurgicale dans la partie supérieure du thorax. Ce boîtier est muni d'un cathéter mince et souple introduit directement dans la veine.

Le système est entièrement implanté sous la peau de sorte que rien ne paraît de l'extérieur. La chambre implantable peut être utilisée dès son installation.

La chambre implantable permet d'administrer des médicaments directement dans les veines (ex. : soluté, chimiothérapie, antibiotique, alimentation intraveineuse) et d'effectuer des prélèvements sanguins. Cela est réalisé selon une procédure stérile en utilisant une aiguille spéciale à pointe courbée (aiguille à pointe Huber).

L'aiguille peut être retirée immédiatement après l'administration de médicaments ou laissée en place jusqu'à 7 jours. Après le retrait de l'aiguille, il faut attendre 48 heures pour que la peau couvrant le cathéter se cicatrise avant de l'immerger dans l'eau.

Cathéter installé le :

Types de cathéter :

- Chambre implantable avec valve
- Chambre implantable sans valve
- Autre : _____

Premières 48 heures après l'installation

- Il est normal que la peau autour du cathéter soit bleutée (ecchymose).
- Limitez les activités du bras situé du même côté que le cathéter.
- Évitez d'effectuer des mouvements de bras au-dessus de votre tête (ex. : se coiffer ou se laver les cheveux).
- Ne pas mouiller votre pansement ou votre plaie (éviter la baignade).
- Retirez le pansement coussiné dès le lendemain, mais conserver les diachylons de rapprochements directement sur la peau.
- Ne pas appliquer de crème ou d'onguent.
- Si les points de suture vous incommodent lorsque vous portez vos vêtements, mettez une petite compresse sur l'endroit où est installé le cathéter (site).
- Les points de suture seront retirés de 7 à 14 jours plus tard par une infirmière de votre CLSC ou lors de vos prochains traitements (sauf pour les points fondants). Les diachylons de rapprochements se décolleront et tomberont après quelques jours.

Signes et symptômes à surveiller

Tout signe d'irritation ou d'infection : rougeur, enflure, douleur, chaleur au site et frissons/fièvre.

Signes ou symptômes du déplacement du cathéter : enflure au site, douleur dans le cou ou à l'oreille du côté du cathéter, bruit de glissement, palpitations au cœur.

IMPORTANT | En présence d'un de ces signes ou symptômes, communiquez sans délai avec la ligne dédiée : 1 888 939-5050.

Conseils lors de vos activités quotidiennes

Lorsque le cathéter **n'est pas utilisé** :

- gardez la peau du site propre en vous lavant tous les jours;
- la douche et le bain sont permis 4 jours après l'installation;
- la baignade est permise 7 jours après l'installation;
- évitez d'appliquer une crème ou un onguent sur la peau du site sans indication du médecin;
- vaquer à vos activités habituelles à moins d'avis contraire;
- pour éviter que le cathéter se bloque entre les utilisations, celui-ci doit être irrigué environ toutes les 4 semaines par une infirmière du CLSC;
- une carte d'identification comprenant des informations relatives à votre cathéter vous sera remise (apportez-la toujours avec vous).

Ligne dédiée : 1 888 939-5050

24 heures sur 24 • 7 jours sur 7



Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Lanaudière

Québec



Production :
Direction des soins infirmiers
Octobre 2021
14-04342