

LANAUDIÈRE

SOUS ENQUÊTE - MISE À JOUR 2013-2014

Évolution pour la région de Lanaudière de 2007-2008 à 2013-2014

Sources :

Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, FMGD, 2009.

Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, FMGD version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, numéro 82M0013XCB-2013000 au catalogue, 2013.

Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014*, numéro 82M0013XCB-2016001 au catalogue, 2016.

Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2007-2008 à 2013-2014*, FMGD. Rapports de l'Infocentre de santé publique du Québec, avril, mai et juin 2016. Mise à

Mise à jour du tableau : janvier 2017

	Population	2007-2008	2009-2010	2011-2012	2013-2014
État de sécurité alimentaire					
		%	%	%	%
Population dont le ménage a connu une insécurité alimentaire - 12 derniers mois	12 ans et +	4,5 *	6,8 *	6,8 *	6,1 *
Jeu de hasard et d'argent					
Ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent - 12 derniers mois	12 ans et +	73,6	nd	nd	67,7 ↓
Ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent - 12 derniers mois	18 ans et +	81,1	nd	nd	72,7 ↓
Joueurs sans problème de jeu - 12 derniers mois	18 ans et +	41,9	nd	nd	54,4 ↑
Activités physiques					
Actifs dans les loisirs - 3 derniers mois	12-17 ans	49,7	37,2 *	48,9	42,1 *
Un peu ou très peu actifs ou sédentaires dans les loisirs - 3 derniers mois	12-17 ans	31,3 *	40,6 *	32,6 *	30,7 *
Actifs dans les loisirs et les transports ¹ - 3 derniers mois	12-17 ans	50,6	42,7 *	50,2	46,2 *
Actifs dans les loisirs - 3 derniers mois	18 ans et +	33,1	36,9	35,6	35,5
Sédentaires dans les loisirs - 3 derniers mois	18 ans et +	26,1	23,5	28,5	26,3
Actifs dans les loisirs et les transports - 3 derniers mois	18 ans et +	34,0	38,3	37,3	36,6
Consommation d'alcool					
Buveurs actuels (réguliers et occasionnels) - 12 derniers mois	12 ans et +	82,8	78,3	83,5	82,7
Buveurs ayant eu une consommation élevée d'alcool au moins une fois par mois - 12 derniers mois	Buveurs	22,2	18,1	22,2	23,7
Buveurs actuels (réguliers et occasionnels) - 12 derniers mois	12 ans et +	51,9	48,5	46,7	39,0 *
Buveurs actuels (réguliers et occasionnels) - 12 derniers mois	18 ans et +	86,5	81,5	87,0	86,7
Buveurs ayant eu une consommation élevée d'alcool au moins une fois par mois - 12 derniers mois	Buveurs	23,1	18,7	23,0	23,8
Habitudes alimentaires					
Consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des légumes	12 ans et +	50,0	51,2	54,3	54,2
Consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des légumes	18 ans et +	51,5	50,7	54,5	54,4
Tabagisme					
Fumeurs actuels de la cigarette (réguliers et occasionnels)	12 ans et +	28,8	23,9	26,7	23,7
Fumeurs actuels de la cigarette (réguliers et occasionnels)	18 ans et +	30,5	24,8	28,6	25,3
Prévalence des maladies chroniques					
Arthrite / Rhumatisme	18 ans et +	10,9	11,9	14,2	12,2
Asthme	12 ans et +	9,0	7,7	9,7	10,1
Incontinence urinaire	25 ans et +	nd	2,1 **	4,4 * ↑	3,4 *
Maladies cardiaques	12 ans et +	6,1	4,3 *	6,5 *	5,2 *
Maux de dos	12 ans et +	17,6	18,3	17,0	19,0
Migraines	12 ans et +	9,7	10,5	10,9	8,0
Troubles intestinaux	12 ans et +	3,1 *	3,3 *	3,6 *	4,0 *
Ulcères à l'estomac ou à l'intestin	12 ans et +	2,6 *	2,6 *	2,8 *	3,6 *
Blessures entraînant des limitations					
Victimes de blessures entraînant des limitations - 12 derniers mois	12 ans et +	nd	10,5	nd	16,7 ↑
Vaccination contre la grippe					
Ayant reçu le vaccin contre la grippe saisonnière - 12 derniers mois	50 ans et +	43,7	33,7	39,0	33,2 ↓
Poids corporel					
Surplus de poids (embonpoint et obésité)	18 ans et +	53,8	52,8	52,3	55,7
Embonpoint	18 ans et +	35,8	33,8	35,3	35,0
Obésité	18 ans et +	18,0	19,0	17,1	20,7
Exposition à la fumée secondaire²					
Population exposée à la fumée secondaire à la maison	12 ans et +	24,7	22,3	20,4	18,8
Non-fumeurs exposés à la fumée secondaire à la maison - le dernier mois	12 ans et +	11,9	13,8	9,9	9,6
Non-fumeurs exposés à la fumée secondaire dans les lieux publics - le dernier mois	12 ans et +	9,5	5,5 *	7,7 *	9,4
Sentiment d'appartenance à sa communauté locale					
Très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale	12 ans et +	13,6	14,5	11,6	10,7
État de santé					
Percevant sa santé comme excellente ou très bonne	12 ans et +	62,3	62,0	58,5	57,3
Percevant sa santé comme passable ou mauvaise	12 ans et +	10,5	8,5	11,1	10,5
Se percevant en moins bonne santé comparé à l'an dernier (un peu moins et bien moins) ¹	12 ans et +	10,6	13,7	9,9	12,5
Très satisfait de sa vie en général ¹	12 ans et +	44,0	44,2	44,0	42,2
État de santé mentale					
Percevant sa santé mentale comme excellente ou très bonne	12 ans et +	77,5	77,9	77,6	76,2
Percevant sa santé mentale comme passable ou mauvaise	12 ans et +	3,6 *	3,2 *	3,8 *	4,7 *
Ayant consulté un professionnel de la santé mentale - 12 derniers mois	12 ans et +	nd	8,8	10,2	10,3
Stress quotidien					
Éprouvant un stress quotidien intense ou élevé	15 ans et +	27,9	27,9	27,7	28,1
Travailleurs éprouvant un stress quotidien élevé au travail - 12 derniers mois	Travailleurs 15-74 ans	38,3	36,5	37,5	38,7

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : donnée non disponible

¹ Les tests statistiques ont été comparés à ceux de l'ensemble du Québec, au seuil de 5 %.

² On retient l'exposition à la fumée secondaire des cigarettes, des cigares et des pipes, «chaque jour» ou «presque chaque jour».

Notes :

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Les pourcentages de chaque indicateur ont été comparés entre eux. Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à la période précédente pour laquelle une donnée est présentée, au seuil de 5 %.

■ Pourcentage significativement plus favorable à celui du reste du Québec, au seuil de 5 %.

■ Pourcentage significativement moins favorable à celui du reste du Québec, au seuil de 5 %.