

Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 - Tableau de bord des principaux indicateurs

Région de Lanaudière

Volet 2 : La santé physique et
les habitudes de vie

Service de surveillance, recherche et évaluation
Direction de santé publique

Février 2019

Conception et rédaction

Geneviève Marquis, technicienne en recherche psychosociale
Patrick Bellehumeur, agent de planification, de programmation et de recherche

Traitement des données

Christine Garand, technicienne en recherche psychosociale
Geneviève Marquis, technicienne en recherche psychosociale
Josée Payette, technicienne en recherche psychosociale

Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

Conception graphique et mise en page

Carolle Gariépy

Pour toute information supplémentaire relative à ce document, veuillez communiquer avec :

Christine Garand au 450 759-6660 ou sans frais au 1 855 759-6660, poste 4417 ou par courriel au christine_garand@ssss.gouv.qc.ca
Geneviève Marquis au 450 759-6660 ou sans frais au 1 855 759-6660, poste 4311 ou par courriel au genevieve_marquis@ssss.gouv.qc.ca
Josée Payette au 450 759-6660 ou sans frais au 1 855 759-6660, poste 4244 ou par courriel au josee_payette@ssss.gouv.qc.ca

La version électronique de ce document est disponible sur notre site Web au www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca sous *Documentation/Santé publique/Portraits populationnels - jeunes*.

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée. Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

MARQUIS, Geneviève et Patrick BELLEHUMEUR. *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 - Tableau de bord des principaux indicateurs. Région de Lanaudière. Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, février 2019, 80 pages.

Source du visuel : © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*

© Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière, 2019

Dépôt légal

Premier trimestre 2019

ISBN : 978-2-550-83288-1 (imprimé)

978-2-550-83289-8 (en ligne)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Table des matières

Mise en contexte	6
Objectifs et thèmes étudiés	6
Quelques aspects méthodologiques	7
Comparaison des résultats	7
Signification des abréviations dans les tableaux	8
La perception de l'état de santé.....	9
Perception de sa santé.....	10
Santé perçue	10
La santé respiratoire	11
Santé respiratoire	12
Sifflements dans la poitrine	12
Symptômes de rhinite allergique.....	13
Symptômes de rhinite allergique ou non	14
Le statut pondéral, l'apparence corporelle et les actions à l'égard du poids	15
Statut pondéral.....	16
Poids insuffisant.....	16
Surplus de poids.....	17
Obésité.....	18
Apparence corporelle.....	19
Évaluation de son apparence.....	19
Évaluation de son poids	20
Actions à l'égard du poids.....	21
Tentative de perdre du poids	21
L'activité physique de loisir et de transport.....	23
Activité physique de loisir.....	24
Actifs dans les activités physiques de loisir	24
Sédentaires dans les activités physiques de loisir	25
Activité physique de transport	26
Actifs dans les activités physiques de transport.....	26
Sédentaires dans les activités physiques de transport.....	27
Activité physique de loisir et de transport.....	28
Actifs dans les activités physiques de loisir et de transport.....	28
Sédentaires dans les activités physiques de loisir et de transport.....	29

Les habitudes alimentaires	31
Habitudes alimentaires	32
Consommation de fruits et de légumes	32
Consommation de produits laitiers	33
Consommation d'eau.....	34
Consommation de boissons sucrées, de grignotines ou de sucreries.....	35
Consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croute.....	36
Prise du déjeuner.....	37
Diagnostic d'allergies alimentaires.....	38
Les comportements sexuels.....	39
Comportements sexuels	40
Relation sexuelle consensuelle.....	40
Âge d'initiation à la première relation sexuelle.....	41
Nombre de partenaires	42
Utilisation du condom	43
La consommation d'alcool et de drogues et ses conséquences	45
Consommation d'alcool	46
Consommation d'alcool.....	46
Fréquence de consommation d'alcool	47
Consommation régulière d'alcool.....	48
Consommation excessive d'alcool.....	49
Âge d'initiation à la consommation d'alcool (12 ans)	50
Âge d'initiation à la consommation d'alcool (13 ans)	51
Consommation de drogues.....	52
Consommation de drogues.....	52
Consommation régulière de drogues	53
Âge d'initiation à la consommation de drogues (12 ans)	54
Âge d'initiation à la consommation de drogues (13 ans)	55
Consommation de cannabis	56
Fréquence de consommation de cannabis.....	57
Consommation problématique d'alcool ou de drogues	58
Polyconsommateurs d'alcool et de drogues	58
Conséquence négative associée à la consommation d'alcool ou de drogues.....	59
Indice DEP-ADO feu vert.....	60
Indice DEP-ADO feu jaune	61
Indice DEP-ADO feu rouge.....	62

L'usage des produits du tabac.....	63
Usage des produits du tabac.....	64
Usage de la cigarette à vie.....	64
Usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours.....	65
Usage du cigarillo et du petit cigare au cours des 30 derniers jours.....	66
Usage de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours.....	67
Âge d'initiation à la cigarette (12 ans).....	68
Âge d'initiation à la cigarette (13 ans).....	69
Le sommeil	71
Sommeil	72
Nombre recommandé d'heures de sommeil.....	72
L'expérience de travail et les blessures liées à l'emploi	73
Expérience de travail.....	74
Occupation d'un emploi	74
Nombre d'heures travaillées	75
Consignes ou entraînement reçus sur la sécurité et les dangers au travail	76
Blessures liées à l'emploi.....	77
Blessures durant l'emploi principal	77
Références bibliographiques	78

Mise en contexte

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) a réalisé, en 2016-2017, la deuxième édition de l'*Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)*, et ce, à l'échelle du Québec; la première s'étant déroulée en 2010-2011.

Cette enquête vise à combler des besoins d'information prioritaires en matière de surveillance de l'état de santé et de bien-être des jeunes du secondaire et de ses déterminants à partir d'une sélection d'indicateurs. En fonction de l'ampleur des problématiques, des différences dans le temps et de leurs conséquences sur les jeunes, les résultats de cette enquête devraient être mis à profit afin d'éclairer la prise de décision liée au processus de planification sociosanitaire en permettant, d'une part, d'établir des parallèles entre les résultats obtenus et les actions sur le terrain et, d'autre part, de réfléchir sur ces actions et de les ajuster.

Ce document expose, sous forme de recueil statistique, les principaux résultats de l'EQSJS 2016-2017, en les comparant, dans la mesure du possible, à l'édition de 2010-2011. Il couvre la région de Lanaudière, ses deux territoires de réseau local de services (Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud)¹ et le Québec. Il regroupe des informations locales fiables et faciles à interpréter. Les indicateurs retenus sont ventilés par sexe et par cycle scolaire.

Objectifs et thèmes étudiés

L'objectif général de l'EQSJS 2016-2017 consiste à dresser un portrait de santé des jeunes fréquentant les écoles secondaires du Québec. L'enquête vise à recueillir de l'information sur leur état de santé physique et mentale, sur leurs habitudes de vie ainsi que sur leur adaptation sociale. Elle permet aussi de recueillir de l'information sur les caractéristiques démographiques, socioéconomiques et scolaires des élèves du secondaire permettant d'étudier les liens entre celles-ci et leur état de santé ou leurs habitudes de vie. Finalement, elle permet de suivre l'évolution dans le temps de l'état de santé des jeunes et de ses déterminants en les comparant avec les données de 2010-2011 (Plante, Courtemanche et Berthelot, 2018).

Les indicateurs sélectionnés sont rattachés aux thèmes suivants :

Volet 1 : L'adaptation sociale et la santé mentale

- Environnement communautaire, des amis, familial et scolaire
- Estime de soi et compétences sociales
- Santé mentale
- Violence et problèmes de comportement
- Risque de décrochage scolaire

Volet 2 : La santé physique et les habitudes de vie

- Perception de l'état de santé
- Santé respiratoire
- Statut pondéral, apparence corporelle et actions à l'égard du poids
- Activité physique de loisir et de transport
- Habitudes alimentaires
- Allergies alimentaires
- Comportements sexuels chez les élèves de 14 ans et plus et orientation sexuelle

¹ Lanaudière-Nord englobe les MRC de D'Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm. Lanaudière-Sud couvre les MRC de L'Assomption et des Moulins. Ces données sont disponibles, car la Direction de santé publique a suréchantillonné pour obtenir des données infrarégionales.

- Consommation d'alcool et de drogues
- Usage des produits du tabac
- Sommeil
- Expérience de travail et blessures liées à l'emploi

Quelques aspects méthodologiques

La population visée par l'EQSJS 2016-2017 porte sur quelque 388 000 élèves de la 1^{re} à la 5^e année du secondaire, inscrits au secteur des jeunes dans les écoles québécoises publiques et privées, francophones et anglophones, à l'automne 2016. Sont exclus les élèves qui fréquentent les centres de formation professionnelle, les écoles situées dans les régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, les écoles de langue d'enseignement autochtone, les écoles gouvernementales hors réseau et celles composées d'au moins 30 % d'élèves handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (ISQ, 2018, p. 15).

Le questionnaire de l'enquête a été rempli par 62 277 élèves répartis dans seize régions sociosanitaires du Québec. La presque totalité des élèves répondants (99 %) a rempli un questionnaire autoadministré à l'aide d'un miniportable (auto-interview assistée par ordinateur). La collecte de données s'est tenue de novembre 2016 à mai 2017.

Dans Lanaudière, ce sont 4 186 élèves présents dans 188 classes des 27 écoles sélectionnées qui ont accepté de répondre au questionnaire pour un taux de réponse pondéré de 91 %. La taille de l'échantillon lanauchois de répondants représente environ 18 % des 23 594 élèves de la population visée.

Comparaison des résultats

La présence de différences en fonction du territoire de l'école, du sexe ou du cycle scolaire est établie à l'aide de tests statistiques de comparaison. Pour l'ensemble des données lanauchoises des deux éditions, un seuil de 5 % a été utilisé. Quant au Québec, le seuil a été établi à 5 % en 2010-2011 et à 1 % en 2016-2017². Pour la plupart des indicateurs, les tests de comparaison prennent en considération les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS de l'ensemble du Québec en 2016-2017.

La collecte de données plus tardive lors de l'EQSJS 2016-2017 que lors de l'EQSJS 2010-2011 a causé un léger écart dans la répartition d'âge des répondants au moment de l'enquête. Après une analyse réalisée par l'ISQ, il y a près de 10 % des indicateurs étudiés qui sont affectés par la période de collecte. **Pour ces indicateurs, la donnée de l'EQSJS 2016-2017 ne peut pas être directement comparée avec celle de l'édition 2010-2011** (ISQ, 2018, p. 37). Pour réaliser cette comparaison, la donnée de 2010-2011 a dû être corrigée en réalisant une standardisation directe³. De plus, toujours pour les indicateurs affectés, les données par RLS de l'édition 2016-2017 ne peuvent être comparées directement avec celles d'un autre territoire dû à la même situation. Encore une fois, seules les données comparables ont été utilisées pour effectuer les comparaisons entre les territoires. L'ensemble des tests statistiques réalisés pour ces indicateurs prennent en compte ces situations. D'ailleurs, une note de bas de tableau avertit le lecteur lorsque l'indicateur est affecté.

² Un changement dans la méthodologie de l'enquête fait en sorte qu'en 2016-2017, il est recommandé d'utiliser ce seuil pour les comparaisons statistiques, alors que ce n'était pas le cas pour le cycle précédent. Cette modification fait en sorte que certaines différences obtenues en 2010-2011 au Québec, par sexe ou par cycle scolaire, pourraient ne pas être confirmées en 2016-2017 en raison du changement de seuil.

³ Pour plus de détails, veuillez consulter le guide spécifique des aspects méthodologiques de l'enquête (ISQ, 2018).

Mises en garde

Il est très important de garder à l'esprit que l'absence de différence significative au plan de la statistique entre deux pourcentages ne signifie pas pour autant qu'ils soient identiques. Il faut plutôt conclure que le test de comparaison ne détecte aucun écart statistique apparent entre les deux pourcentages.

Deux pourcentages, si éloignés soient-ils l'un de l'autre, ne peuvent pas être considérés comme étant différents si l'écart entre eux n'est pas confirmé statistiquement.

La présence de deux pourcentages bruts identiques ne signifie pas automatiquement qu'aucun écart n'existe entre eux. Le test statistique de comparaison qui est effectué avec les taux ajustés pourrait détecter une différence.

Signification des abréviations dans les tableaux

Les lettres « s.o. » (sans objet) signifient que la comparaison entre les pourcentages des éditions 2010-2011 et 2016-2017 ne peut pas être effectuée. Cela s'explique par l'absence de l'indicateur dans l'édition 2010-2011.

Les lettres « nc » (données non comparées en raison des règles de confidentialité) impliquent, pour un même indicateur, que la comparaison chronologique ne peut pas être réalisée parce qu'au moins un des pourcentages concernés est masqué en raison d'un trop petit nombre de répondants.

Les lettres « nd » (donnée non disponible) rendent compte de l'inexistence de données pour l'édition 2010-2011 de l'indicateur concerné.

Les lettres « np » (donnée non présentée en raison des règles de masquage) s'appliquent aux cellules comportant des résultats impliquant un trop faible nombre de répondants. Une pareille situation peut affecter la confidentialité de l'information, ainsi que sa précision statistique.

Les lettres « ns » (non significatif) indiquent que le test statistique de comparaison temporel ne décèle pas d'écart significatif, au seuil de 5 % pour les territoires Lanaudois et de 1 % pour le Québec, entre deux pourcentages, sans pour autant que cela puisse signifier qu'ils soient identiques.

La perception
de l'état de
santé


Perception de sa santé


Santé perçue


Proportion des élèves du secondaire ne se percevant pas en bonne santé selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	5,3 *	5,9	ns	5,1	3,4 * -	ns
Garçons	2,9 *	3,7 *	ns	3,8 *	4,2 *	ns
Sexes réunis	4,1 *	4,8	ns	4,4	3,8	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	3,8 **	4,1 *	ns	3,8 *	2,0 * -	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	4,3 *	5,5	ns	4,9	5,2 *	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	5,2	4,5	ns	5,0	5,1	ns
Garçons	3,4 *	4,0 *	ns	3,7	3,5	ns
Sexes réunis	4,3	4,2	ns	4,3	4,3	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	3,8 *	2,8	ns	4,1	3,3	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	4,7	5,3	ns	4,5	4,9	ns

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.



La santé
respiratoire

Santé respiratoire

Sifflements dans la poitrine

Proportion des élèves du secondaire ayant eu des sifflements dans la poitrine à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	22,6	30,1	↑	22,1	23,3	ns
Garçons	14,2	13,8	ns	17,1	17,6	ns
Sexes réunis	18,3	22,3	↑	19,6	20,4	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	17,7	23,6	ns	17,0 *	21,5	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	18,9	21,2	ns	21,6	19,5	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	22,3	26,1	ns	20,9	23,8	↑
Garçons	16,0	16,2	ns	15,9	16,9	ns
Sexes réunis	19,1	21,1	ns	18,3	20,3	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	17,3	22,4 +	↑	16,9	18,7	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	20,5	20,1	ns	19,3	21,4	↑

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.

Proportion des élèves du secondaire ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	23,0	s.o.	nd	26,1	s.o.
Garçons	nd	15,3	s.o.	nd	19,6	s.o.
Sexes réunis	nd	19,3	s.o.	nd	22,7	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	21,2	s.o.	nd	24,0	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	17,9 -	s.o.	nd	21,8	s.o.

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	24,8	s.o.	nd	24,5	s.o.
Garçons	nd	18,0	s.o.	nd	19,1	s.o.
Sexes réunis	nd	21,4	s.o.	nd	21,8	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	22,8	s.o.	nd	19,7	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	20,3 -	s.o.	nd	23,3	s.o.

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

nd : donnée non disponible

s.o. : sans objet

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018.

Santé respiratoire

Symptômes de rhinite allergique ou non

Proportion des élèves du secondaire ayant eu des symptômes de rhinite (allergique ou non) au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	53,3	s.o.	nd	58,5	s.o.
Garçons	nd	49,8	s.o.	nd	55,2	s.o.
Sexes réunis	nd	51,6	s.o.	nd	56,8	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	51,2	s.o.	nd	57,1	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	52,0	s.o.	nd	56,6	s.o.

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	56,4	s.o.	nd	56,7	s.o.
Garçons	nd	53,2	s.o.	nd	51,7	s.o.
Sexes réunis	nd	54,8	s.o.	nd	54,2	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	54,7	s.o.	nd	53,0	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	54,8	s.o.	nd	55,0	s.o.

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

Note : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSIS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

nd : donnée non disponible

s.o. : sans objet

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018.

Le statut
pondéral,
l'apparence
corporelle et les
actions à
l'égard du
poids


Statut pondéral


Poids insuffisant


Proportion des élèves du secondaire présentant un poids insuffisant selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	11,2	9,4 -	ns	10,8	12,9	ns
Garçons	7,7	10,2	ns	8,9	11,2	ns
Sexes réunis	9,5	9,8	ns	9,9	12,0	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	11,3	12,7	ns	11,3	15,9	↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	8,1	7,6 -	ns	8,9	9,3	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	11,0 -	11,5	ns	12,4	12,4	ns
Garçons	8,4	10,8	↑	8,1	10,9	↑
Sexes réunis	9,7	11,1	↑	10,2	11,6	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	11,3	14,6	↑	12,1	13,8	↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	8,6	8,6 -	ns	9,0	10,1	↑

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


Proportion des élèves du secondaire présentant un surplus de poids (embonpoint + obésité) selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	17,9	24,1 +	↑	17,2	18,1	ns
Garçons	24,0	26,4	ns	23,3	22,2	ns
Sexes réunis	21,0	25,2 +	↑	20,2	20,3	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	21,0	25,8 +	ns	23,4	17,8	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	21,0	24,7 +	ns	18,1	22,0	↑

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	17,5	20,6 +	↑	16,6	18,6	↑
Garçons	23,6	23,8	ns	25,2	22,9	↓
Sexes réunis	20,5	22,2	ns	21,0	20,8	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	22,3	21,0	ns	21,2	20,7	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	19,3	23,1 +	↑	20,9	20,9	ns

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


Statut pondéral


Obésité


Proportion des élèves du secondaire présentant de l'obésité selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	6,8	9,7 +	↑	7,0	4,9	ns
Garçons	8,2	9,1	ns	7,3	7,8	ns
Sexes réunis	7,5	9,4 +	ns	7,2	6,5	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	7,4 *	9,4 +	ns	9,6	5,4 *	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	7,6	9,4 +	ns	5,6	7,2	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	6,9	6,9 +	ns	5,8	5,8	ns
Garçons	7,7	8,3	ns	7,7	7,4	ns
Sexes réunis	7,3	7,6 +	ns	6,8	6,7	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	8,6	7,0	ns	7,6	7,4	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	6,4	8,0 +	ns	6,2	6,2	ns

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.

Proportion des élèves du secondaire satisfaits de leur apparence selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	53,0	42,7	↓	51,4	44,0	↓
Garçons	53,4	46,4	ns	53,2	42,3	↓
Sexes réunis	53,2	44,5	↓	52,3	43,1	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	50,7	41,1	↓	51,9	45,1	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	55,1	47,2	↓	52,6	41,6	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	52,0	43,5	↓	51,3	43,0	↓
Garçons	53,3	43,8	↓	51,5	46,4	↓
Sexes réunis	52,7	43,6	↓	51,4	44,7	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	51,4	43,5	↓	53,5	46,8	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	53,6	43,8	↓	50,0	43,2	↓

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.

Apparence corporelle

Évaluation de son poids

Proportion des élèves du secondaire s'étant évalués avec un poids insuffisant selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	19,9	15,3	ns	19,5	13,1	↓
Garçons	8,6 *	9,8 *	ns	10,0 *	11,3	ns
Sexes réunis	14,1	12,6	ns	14,7	12,2	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	17,0	14,1	ns	16,3 *	13,8 *	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	11,9	11,5	ns	13,6	11,0	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	19,6	14,0	↓	19,9	14,8	↓
Garçons	9,4	10,7	ns	10,9	9,8	ns
Sexes réunis	14,5	12,4	ns	15,4	12,3	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	16,6	13,9	ns	17,8	13,7	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	12,9	11,2	ns	13,7	11,2	↓

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.

Actions à l'égard du poids

Tentative de perdre du poids

Proportion des élèves du secondaire essayant de perdre du poids selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	32,2	27,6	ns	31,9	31,8	ns
Garçons	14,9	16,2	ns	16,1	16,8	ns
Sexes réunis	23,4	22,2	ns	24,1	24,0	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	23,9	23,4	ns	25,7	23,6	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	22,9	21,1	ns	22,8	24,3	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	32,0	30,1	ns	32,2	30,6	ns
Garçons	15,6	16,6	ns	17,8	16,0	↓
Sexes réunis	23,8	23,3	ns	24,9	23,1	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	25,0	23,5	ns	24,5	21,3	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	22,9	23,1	ns	25,2	24,4	ns

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.

L'activité
physique de
loisir et de
transport

Activité physique de loisir

Actifs dans les activités physiques de loisir

Proportion des élèves du secondaire actifs¹ dans les activités physiques de loisir durant l'année scolaire selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017 ³	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017 ³
	%	%		%	%	
Filles	7,5 -	13,7 *	↑	9,2	10,3	ns
Garçons	20,8	19,6	ns	18,3	18,2 -	ns
Sexes réunis	14,3	16,5	ns	13,7 -	14,4	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	13,2 -	15,6 *	ns	12,3 -	13,5	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	15,2	17,3 *	ns	14,8	15,1	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017 ³	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017 ³
	%	%		%	%	
Filles	8,5 -	11,7	ns	10,4	12,8	↑
Garçons	19,3	18,7 -	ns	21,2	22,3	ns
Sexes réunis	14,0 -	15,3 -	ns	15,9	17,7	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	12,7 -	14,3 -	ns	15,8	17,8	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	14,9	16,0	ns	15,9	17,6	ns

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Ce niveau correspond à un volume équivalent à au moins 7 heures par semaine (moyenne d'une heure par jour et plus) d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Sont exclues les activités pratiquées durant le cours d'éducation physique.

² La méthode d'attribution des niveaux d'activité physique a été légèrement modifiée en 2016-2017. Les données de 2010-2011 ont été recalculées en suivant cette méthode, ce qui explique que les estimations peuvent différer de celles présentées dans des publications antérieures.

³ Seules les données provenant du questionnaire 2 ont été utilisées pour la comparaison temporelle. Cela fait en sorte que les données des deux éditions présentées dans le tableau ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de comparaison demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018.

Proportion des élèves du secondaire sédentaires¹ dans les activités physiques de loisir durant l'année scolaire selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017 ³	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017 ³
	%	%		%	%	
Filles	45,8 +	40,1	ns	38,7	39,9	ns
Garçons	31,0	37,1 +	ns	31,7	33,1	ns
Sexes réunis	38,3 +	38,6 +	ns	35,2	36,4	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	36,6	36,9	ns	36,3	32,6	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	39,6	40,0 +	ns	34,4	39,1	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017 ³	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017 ³
	%	%		%	%	
Filles	41,6 +	40,0 +	ns	37,8	36,2	ns
Garçons	31,4	34,6 +	ns	29,3	31,1	ns
Sexes réunis	36,5 +	37,3 +	ns	33,5	33,6	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	36,5	34,3	ns	33,1	32,6	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	36,5	39,5 +	ns	33,8	34,3	ns

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Ce niveau correspond à une pratique inférieure à une fois par semaine (aucune activité ou activité irrégulière). Une pratique inférieure à 10 minutes dans une journée type est aussi intégrée à cette catégorie. Sont exclues les activités pratiquées durant le cours d'éducation physique.

² La méthode d'attribution des niveaux d'activité physique a été légèrement modifiée en 2016-2017. Les données de 2010-2011 ont été recalculées en suivant cette méthode, ce qui explique que les estimations peuvent différer de celles présentées dans des publications antérieures.

³ Seules les données provenant du questionnaire 2 ont été utilisées pour la comparaison temporelle. Cela fait en sorte que les données des deux éditions présentées dans le tableau ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de comparaison demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière pour cet indicateur.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018.

Activité physique de transport

Actifs dans les activités physiques de transport

Proportion des élèves du secondaire actifs¹ dans les activités physiques de transport durant l'année scolaire selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	2,5 **	3,4 *	ns	5,0 *	2,4 *	ns
Garçons	7,9 *	6,8	ns	9,4 *	5,7	↓
Sexes réunis	5,3	5,0	ns	7,2	4,1	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	5,8 *	5,3	ns	6,5 *	3,9 *	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	4,8 *	4,8	ns	7,7	4,2	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	4,0 *	2,8	ns	3,7	3,4	ns
Garçons	8,8	6,1	↓	7,7	5,7	↓
Sexes réunis	6,4	4,5	↓	5,7	4,6	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	6,2	4,5	ns	5,9	4,6	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	6,5	4,4	↓	5,5	4,5	↓

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Ce niveau correspond à un volume équivalant à au moins 7 heures par semaine (moyenne d'une heure par jour et plus) d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Sont exclues les activités pratiquées durant le cours d'éducation physique.

² La méthode d'attribution des niveaux d'activité physique a été légèrement modifiée en 2016-2017. Les données de 2010-2011 ont été recalculées en suivant cette méthode, ce qui explique que les estimations peuvent différer de celles présentées dans des publications antérieures.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018.

Activité physique de transport

Sédentaires dans les activités physiques de transport

Proportion des élèves du secondaire sédentaires¹ dans les activités physiques de transport durant l'année scolaire selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	63,2 +	65,4 +	ns	57,1	66,4 +	↑
Garçons	58,7 +	62,1 +	ns	52,5	57,3 +	ns
Sexes réunis	60,9 +	63,8 +	ns	54,8	61,7 +	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	61,5 +	60,4 +	ns	57,6	60,7 +	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	60,4 +	66,5 +	ns	52,7	62,5 +	↑

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	59,5	66,0 +	↑	57,0	57,9	ns
Garçons	55,1 +	59,1 +	ns	51,0	53,5	↑
Sexes réunis	57,3 +	62,5 +	↑	53,9	55,6	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	59,3	60,6 +	ns	54,7	55,4	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	55,8	64,0 +	↑	53,4	55,8	↑

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Ce niveau correspond à une pratique inférieure à une fois par semaine (aucune activité ou activité irrégulière). Une pratique inférieure à 10 minutes dans une journée type est aussi intégrée à cette catégorie.

² La méthode d'attribution des niveaux d'activité physique a été légèrement modifiée en 2016-2017. Les données de 2010-2011 ont été recalculées en suivant cette méthode, ce qui explique que les estimations peuvent différer de celles présentées dans des publications antérieures.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Pour cet indicateur, le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière pour tous les territoires comparés.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre et le 4 décembre 2018.


Activité physique de loisir et de transport


Actifs dans les activités physiques de loisir et de transport


Proportion des élèves du secondaire actifs¹ dans les activités physiques de loisir et de transport durant l'année scolaire selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	17,1	23,5	↑	22,5	19,6	ns
Garçons	33,5	31,8	ns	34,7	32,0	ns
Sexes réunis	25,6	27,5	ns	28,5	26,1	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	27,3	27,8	ns	25,9	25,6	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	24,2	27,2	ns	30,4	26,4	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	20,3	21,2	ns	23,6	25,7	↑
Garçons	34,2	31,9	ns	37,4	37,7	ns
Sexes réunis	27,3	26,6	ns	30,6	31,8	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	26,5	26,5	ns	29,3	31,7	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	27,9	26,7	ns	31,5	31,9	ns

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Ce niveau correspond à un volume équivalent à au moins 7 heures par semaine (moyenne d'une heure par jour et plus) d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Sont exclues les activités pratiquées durant le cours d'éducation physique.

² La méthode d'attribution des niveaux d'activité physique a été légèrement modifiée en 2016-2017. Les données de 2010-2011 ont été recalculées en suivant cette méthode, ce qui explique que les estimations peuvent différer de celles présentées dans des publications antérieures.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018.


Activité physique de loisir et de transport


Sédentaires dans les activités physiques de loisir et de transport

Proportion des élèves du secondaire sédentaires¹ dans les activités physiques de loisir et de transport durant l'année scolaire selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	29,6	27,6 +	ns	24,2	27,2 +	ns
Garçons	22,3	27,2 +	ns	21,0	19,2	ns
Sexes réunis	25,8	27,4 +	ns	22,6	23,1 +	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	25,7	25,7 +	ns	22,9	20,4	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	25,9	28,7 +	ns	22,5	25,0 +	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011 ²	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	26,4	27,4 +	ns	24,6	22,3	↓
Garçons	21,5	22,2 +	ns	18,9	18,5	ns
Sexes réunis	23,9 +	24,8 +	ns	21,7	20,4	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	24,1	22,5 +	ns	22,5	19,7	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	23,8	26,5 +	ns	21,2	20,9	ns

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Ce niveau correspond à une pratique inférieure à une fois par semaine (aucune activité ou activité irrégulière). Une pratique inférieure à 10 minutes dans une journée type est aussi intégrée à cette catégorie. Sont exclues les activités pratiquées durant le cours d'éducation physique.

² La méthode d'attribution des niveaux d'activité physique a été légèrement modifiée en 2016-2017. Les données de 2010-2011 ont été recalculées en suivant cette méthode, ce qui explique que les estimations peuvent différer de celles présentées dans des publications antérieures.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière pour cet indicateur.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre et le 4 décembre 2018.

Les habitudes alimentaires

Habitudes alimentaires

Consommation de fruits et de légumes

Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal¹ de portions de fruits et légumes recommandé quotidiennement par l'ancien Guide alimentaire canadien selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	30,3	24,3	↓	32,4	25,2	↓
Garçons	29,9	24,2	ns	32,1	24,8	↓
Sexes réunis	30,1	24,3	↓	32,3	25,0	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	34,1	28,1	ns	38,8	28,2	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	27,0	21,1	↓	27,5	22,6	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	31,5	24,9	↓	33,0	25,5	↓
Garçons	31,2	24,5	↓	32,7	25,8	↓
Sexes réunis	31,4	24,7	↓	32,9	25,6	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	36,8	28,2	↓	40,2	31,5	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	27,3	22,0	↓	27,8	21,4	↓

Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Il était recommandé que les jeunes de 9 à 13 ans (filles et garçons) consomment au moins 6 portions de fruits et légumes par jour et que les jeunes de 14 à 18 ans en consomment au moins 7 par jour pour les filles et 8 par jour pour les garçons.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.


Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal¹ de portions de produits laitiers recommandé quotidiennement par l'ancien Guide alimentaire canadien selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	44,2	32,7	↓	44,0	26,6	↓
Garçons	50,8	43,0	↓	51,9	44,9	ns
Sexes réunis	47,6	37,6	↓	47,9	36,1	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	49,7	40,2	↓	46,8	35,2	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	45,9	35,5	↓	48,7	36,7	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	44,1	29,1	↓	42,4	28,6	↓
Garçons	51,5	44,2	↓	53,6	43,6	↓
Sexes réunis	47,8	36,7	↓	48,1	36,2	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	48,0	37,3	↓	49,3	37,9	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	47,6	36,2	↓	47,2	35,0	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Au moins trois par jour.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018.

Habitudes alimentaires

Consommation d'eau

Proportion des élèves du secondaire consommant au moins un verre d'eau par jour selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	90,5	92,8	ns	92,6	91,4	ns
Garçons	93,8	95,0	ns	94,9	95,2	ns
Sexes réunis	92,2	93,9	ns	93,7	93,4	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	94,0	94,4	ns	93,9	92,0	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	90,8	93,5	ns	93,6	94,4	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	91,7	92,0	ns	92,0	93,3	↑
Garçons	94,4	95,1	ns	95,0	96,3	↑
Sexes réunis	93,1	93,6	ns	93,6	94,8	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	93,9	92,9	ns	93,9	94,4	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	92,5	94,0	ns	93,3	95,1	↑

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.

Consommation de boissons sucrées, de grignotines ou de sucreries

Proportion des élèves du secondaire consommant quotidiennement au moins une boisson sucrée régulière ou diète, des grignotines ou des sucreries selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	21,5 +	s.o.	nd	19,1	s.o.
Garçons	nd	25,8	s.o.	nd	21,6	s.o.
Sexes réunis	nd	23,5 +	s.o.	nd	20,4	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	23,2	s.o.	nd	20,4	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	23,8 +	s.o.	nd	20,3	s.o.

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	20,0 +	s.o.	nd	16,9	s.o.
Garçons	nd	23,2	s.o.	nd	20,5	s.o.
Sexes réunis	nd	21,6 +	s.o.	nd	18,7	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	21,5	s.o.	nd	19,6	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	21,7 +	s.o.	nd	18,1	s.o.

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSIS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l'édition 2016-2017

s.o. : sans objet

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018.


Habitudes alimentaires


Consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte

Proportion des élèves du secondaire ayant consommé deux fois ou plus de la malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte le midi, au cours de la dernière semaine d'école, selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	18,6 *	12,6	ns	10,9	10,6 *	ns
Garçons	25,6	20,3	ns	20,1	18,7	ns
Sexes réunis	22,2	16,3	↓	15,5	14,8	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	19,3	14,5 *	ns	16,3	14,1	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	24,4	17,7	ns	14,9	15,3	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	14,0	11,4	ns	16,6	14,6	ns
Garçons	22,3	19,3	ns	23,7	20,1	↓
Sexes réunis	18,2	15,4	ns	20,2	17,4	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	17,5	14,3	ns	20,5	16,8	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	18,7	16,2	ns	20,0	17,8	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.

Proportion des élèves du secondaire ayant mangé ou bu tous les jours le matin avant de commencer leur cours, au cours de la dernière semaine d'école, selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	57,1	51,2	ns	57,9	57,9	ns
Garçons	58,8	60,6	ns	63,4	64,0	ns
Sexes réunis	58,0	55,7	ns	60,7	61,1	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	57,8	54,6	ns	62,7	61,2	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	58,1	56,5	ns	59,2	61,0	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	57,6	55,1	ns	56,6	53,6	↓
Garçons	61,5	62,7	ns	62,8	61,7	ns
Sexes réunis	59,6	59,0	ns	59,7	57,7	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	60,7	58,6	ns	59,1	58,6	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	58,7	59,3	ns	60,2	57,1	↓

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.


Habitudes alimentaires


Diagnostic d'allergies alimentaires


Proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic d'allergies alimentaires selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	8,8	8,6	ns	10,1	10,1	ns
Garçons	5,6	6,0	ns	6,9	7,1	ns
Sexes réunis	7,2	7,4	ns	8,5	8,5	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	7,0	8,8	ns	7,0	8,9	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	7,3	6,2	ns	9,7	8,2	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	9,6	9,5	ns	8,9	9,2	ns
Garçons	6,4	6,6	ns	6,6	7,3	ns
Sexes réunis	8,0	8,1	ns	7,7	8,2	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	7,0	8,9	ns	7,7	8,7	↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	8,7	7,5	ns	7,7	7,9	ns

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.



Les
comportements
sexuels


Comportements sexuels


Relation sexuelle consensuelle


Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle¹ consensuelle au cours de leur vie selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	51,4 +	44,0 +	↓	42,4 +	31,7	↓
Garçons	39,2	39,9 +	ns	35,8	36,0	ns
Sexes réunis	45,0 +	42,0 +	ns	39,2 +	33,8	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	28,6	31,6 +	ns	24,6	18,0 **	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	49,3 +	44,6 +	ns	42,0	37,1	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	46,0 +	36,6 +	↓	38,2	32,8	↓
Garçons	37,2	37,5 +	ns	35,9	32,4	↓
Sexes réunis	41,6 +	37,0 +	↓	37,1	32,6	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	26,5	23,9	ns	25,2	18,8	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	44,9 +	40,0 +	↓	39,4	35,5	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Il s'agit de relations sexuelles de type oral, vaginal ou anal.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.


Âge d'initiation à la première relation sexuelle


Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle¹ consensuelle avant l'âge de 14 ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	14,7 +	10,5 +	ns	9,9	5,8 *	↓
Garçons	10,9	8,4	ns	10,9	8,3 *	ns
Sexes réunis	12,7 +	9,5 +	↓	10,4	7,1	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	17,9 *	16,9 *	ns	14,4 *	8,3 **	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	11,3	7,7	↓	9,6	6,8	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	11,8	7,7 +	↓	8,8	5,9	↓
Garçons	10,9	8,3	ns	10,6	7,5	↓
Sexes réunis	11,3	8,0 +	↓	9,8	6,7	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	16,0	12,0 *	ns	14,4	9,7	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	10,3	7,1	↓	8,9	6,1	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Il s'agit de relations sexuelles de type oral, vaginal ou anal.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.

Comportements sexuels

Nombre de partenaires

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles consensuelles avec trois partenaires ou plus à vie selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	24,3	s.o.	nd	20,4	s.o.
Garçons	nd	29,5	s.o.	nd	30,6	s.o.
Sexes réunis	nd	26,7	s.o.	nd	25,8	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	np	s.o.	nd	np	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	np	s.o.	nd	np	s.o.

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	22,2 -	s.o.	nd	28,6	s.o.
Garçons	nd	30,2	s.o.	nd	32,7	s.o.
Sexes réunis	nd	26,2 -	s.o.	nd	30,7	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	17,0 *	s.o.	nd	28,0	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	27,4 -	s.o.	nd	31,0	s.o.

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l'édition 2016-2017

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage

s.o. : sans objet car l'édition 2010-2011 n'est pas comparable avec l'édition 2016-2017

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018.

Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle, parmi ceux ayant eu au moins une relation sexuelle vaginale consensuelle au cours de leur vie, selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	58,9	50,8	↓	60,6	53,2	ns
Garçons	74,5	71,4	ns	74,5	60,4	↓
Sexes réunis	66,0	60,4	↓	66,6	57,0	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	np	68,1	nc	np	77,7	nc
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	np	58,9	nc	np	55,7	nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	59,8	52,0	↓	61,9	54,6	↓
Garçons	74,5	65,1	↓	74,9	66,1	↓
Sexes réunis	66,3	58,5	↓	68,2	60,3	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	83,3	71,1	↓	83,2	74,7	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	64,1	57,1	↓	66,4	58,9	↓

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.

La
consommation
d'alcool et de
drogues et ses
conséquences


Consommation d'alcool


Consommation d'alcool


Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des douze derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017 ¹	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017 ¹
	%	%		%	%	
Filles	64,2 +	59,1 +	ns	62,3 +	53,4	↓
Garçons	67,1 +	57,9 +	↓	60,6 +	49,5	↓
Sexes réunis	65,7 +	58,5 +	↓	61,4 +	51,4	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	42,9 +	34,6	ns	35,2	25,0 -	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	83,4 +	77,7 +	↓	80,8 +	71,3	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017 ¹	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017 ¹
	%	%		%	%	
Filles	63,1 +	55,8	↓	59,1	53,3	↓
Garçons	63,3 +	52,6	↓	60,3	52,0	↓
Sexes réunis	63,2 +	54,2	↓	59,7	52,6	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	38,4	28,8	↓	37,4	28,9	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	81,9 +	73,7 +	↓	75,1	69,9	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par la période de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Cela fait en sorte que les données des deux éditions présentées dans le tableau ne sont pas comparables directement entre elles, et ce, pour un même territoire. Néanmoins, les résultats des tests de comparaison demeurent valables puisqu'ils ont été réalisés avec des données comparables.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.


Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool plus d'une fois par mois au cours des douze derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	13,9	8,4	↓	12,2	8,0	↓
Garçons	20,2	12,6	↓	12,3	10,5	↓
Sexes réunis	17,1 +	10,4	↓	12,3 -	9,3	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	7,1	4,4 *	↓	3,2 * -	1,4 ** -	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	24,9 +	15,3	↓	19,0	15,2	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	12,9	8,2 -	↓	13,2	9,8	↓
Garçons	15,6	11,2	↓	16,7	12,4	↓
Sexes réunis	14,3	9,7 -	↓	15,0	11,1	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	4,8 -	2,6 *	↓	6,2	3,5	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	21,4	15,2	↓	21,1	16,7	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Pour cet indicateur, le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière pour tous les territoires comparés.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.


Consommation d'alcool


Consommation régulière d'alcool


Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins un épisode de consommation régulière¹ d'alcool au cours de leur vie selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	10,7	6,7	↓	8,4	4,5 * -	↓
Garçons	16,2	9,9	↓	11,7	7,7	↓
Sexes réunis	13,5	8,2	↓	10,0	6,2 -	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	7,2 +	4,2 *	↓	3,2 ** -	1,2 ** -	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	18,4	11,5	↓	15,1	9,9	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	9,3	5,4 -	↓	9,6	6,7	↓
Garçons	13,5	8,6	↓	13,4	9,3	↓
Sexes réunis	11,4	7,0	↓	11,5	8,0	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	4,8	2,4 *	↓	5,3	2,8	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	16,4	10,5	↓	15,9	11,9	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Avoir consommé de l'alcool au moins une fois par semaine pendant au moins un mois.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.


Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


Proportion des élèves du secondaire présentant une consommation excessive d'alcool¹ dans une même occasion au cours des douze derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	45,5 +	40,5 +	↓	43,6 +	33,0	↓
Garçons	49,3 +	39,9 +	↓	40,1	31,0	↓
Sexes réunis	47,7 +	40,2 +	↓	41,9 +	31,9	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	23,7	17,4	↓	16,7 -	9,7 -	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	66,0 +	58,5 +	↓	60,5 +	48,6	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	44,4 +	36,0	↓	40,2	34,6	↓
Garçons	43,9 +	34,3	↓	41,9	34,1	↓
Sexes réunis	44,1 +	35,2	↓	41,1	34,3	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	19,6	12,8	↓	20,4	14,2	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	62,7 +	52,4 +	↓	55,4	49,0	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Cinq consommations ou plus dans une même occasion.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


Consommation d'alcool


Âge d'initiation à la consommation d'alcool (12 ans)


Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 12 ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	8,3	5,5 *	ns	6,1	2,7 *	↓
Garçons	15,1	7,6	ns	11,1	5,1 *	↓
Sexes réunis	11,7	6,5	ns	8,6 -	3,9 -	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	13,4	8,9 +	↓	10,5	4,5 *	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	10,5	4,5 *	↓	7,2	3,5 *	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	7,0	3,8	ns	7,5	4,2	↓
Garçons	12,7	6,0 -	↓	12,6	7,4	↓
Sexes réunis	9,9	4,9 -	↓	10,1	5,9	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	11,7	6,3	↓	12,1	7,0	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	8,5	3,9 -	↓	8,7	5,1	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


Âge d'initiation à la consommation d'alcool (13 ans)


Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 13 ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	21,2	13,3	↓	17,9	8,8	↓
Garçons	27,5	16,2	↓	22,5	11,7	↓
Sexes réunis	24,4 +	14,7	↓	20,2	10,3	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	29,5	18,7	↓	26,0	12,3	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	21,5	12,4	↓	17,0	9,2	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	19,2	10,7	↓	18,7	11,3	↓
Garçons	24,6	13,4	↓	24,0	14,8	↓
Sexes réunis	21,9	12,0	↓	21,4	13,1	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	27,4	14,9	↓	26,0	15,8	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	18,8	10,4	↓	19,1	11,6	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


Consommation de drogues


Consommation de drogues


Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours des douze derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	28,5	23,4 +	ns	25,7	15,6 -	↓
Garçons	29,9	25,4 +	ns	25,0	17,8	↓
Sexes réunis	29,2	24,3 +	↓	25,4	16,8 -	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	14,0 *	13,0 * +	ns	8,5 *	5,9 *	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	41,1 +	33,4 +	↓	37,8	24,9 -	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	26,9	18,8	↓	24,8	19,2	↓
Garçons	27,0	20,6	↓	26,5	20,9	↓
Sexes réunis	26,9 +	19,7	↓	25,7	20,0	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	10,8	8,8	ns	11,2	8,0	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	39,1 +	28,2	↓	35,7	28,8	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


Consommation de drogues


Consommation régulière de drogues


Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins un épisode de consommation régulière¹ de drogues au cours de leur vie selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	12,1	10,8 +	ns	11,6	4,6 * -	↓
Garçons	13,6	12,7 +	ns	12,5	6,8	↓
Sexes réunis	12,9	11,7 +	ns	12,0	5,7 -	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	6,7 *	5,7 * +	ns	4,4 **	1,0 **	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	17,7	16,5 +	ns	17,6	9,3	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	11,8	7,2	↓	10,4	6,8	↓
Garçons	12,9	9,0	↓	13,0	8,4	↓
Sexes réunis	12,4	8,1	↓	11,7	7,6	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	5,3 *	2,9 *	↓	5,3	2,8	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	17,7	12,1	↓	16,1	11,1	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Avoir consommé de la drogue au moins une fois par semaine pendant au moins un mois.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


Consommation de drogues


Âge d'initiation à la consommation de drogues (12 ans)

Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 12 ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	1,9 **	0,9 **	ns	0,8 **	0,5 **	ns
Garçons	4,4 * +	2,0 **	ns	2,0 *	1,1 **	ns
Sexes réunis	3,2 * +	1,4 *	ns	1,4 *	0,8 **	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	2,5 *	1,7 **	ns	1,1 **	0,7 **	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	3,7 * +	1,3 **	↓	1,6 *	0,9 **	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	1,2 *	0,6 **	ns	1,0	0,5	↓
Garçons	3,0 +	1,5 *	ns	2,1	1,3	↓
Sexes réunis	2,1 +	1,1 *	ns	1,6	0,9	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	1,7 *	1,1 **	ns	1,5	0,9	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	2,4 * +	1,0 **	↓	1,6	0,9	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


Consommation de drogues


Âge d'initiation à la consommation de drogues (13 ans)

Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 13 ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	7,3 * +	4,9 * +	ns	3,9 *	1,5 **	↓
Garçons	9,3 +	4,9 *	↓	4,1 * -	3,8 *	ns
Sexes réunis	8,4 +	4,9 +	↓	4,0 *	2,7 *	ns
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	8,6 *	5,2 **	ns	3,7 **	1,7 **	ns
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	8,2 +	4,7 *	↓	4,1	3,2 *	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	5,2 +	2,9 *	↓	4,0	2,2	↓
Garçons	6,3	4,2	↓	5,8	3,4	↓
Sexes réunis	5,7	3,5 +	↓	4,9	2,8	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	5,7 *	3,1 *	↓	5,3	2,7	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	5,8	3,8 +	↓	4,7	2,8	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


Consommation de drogues


Consommation de cannabis


Proportion des élèves du secondaire ayant consommé du cannabis au cours des douze derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	27,6	21,2 +	↓	24,8	13,0 -	↓
Garçons	28,8	23,3 +	ns	24,5	15,5 -	↓
Sexes réunis	28,2	22,2 +	↓	24,7	14,3 -	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	13,2 *	9,9 * +	ns	7,9 *	3,0 ** -	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	39,9 +	32,1 +	↓	37,0	22,9 -	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	25,9 +	16,4 -	↓	23,8 -	17,5	↓
Garçons	26,3	18,4 -	↓	26,0 -	18,8	↓
Sexes réunis	26,1	17,4	↓	24,9	18,2	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	10,1	5,7 * -	↓	10,6	6,0 -	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	38,2 +	26,4 -	↓	34,8	27,0 -	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


Consommation de drogues


Fréquence de consommation de cannabis


Proportion des élèves du secondaire ayant consommé du cannabis plus d'une fois par mois au cours des douze derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	9,1	7,1	ns	7,9	3,4 *	↓
Garçons	11,3	10,4 +	ns	9,6	5,6	↓
Sexes réunis	10,2	8,7 +	ns	8,7	4,5 -	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	6,0 *	np	nc	3,4 *	np	nc
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	13,5	np	nc	12,7	np	nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	8,4	4,9	↓	7,8	5,3	↓
Garçons	10,3	7,4	↓	10,9	7,0	↓
Sexes réunis	9,3	6,2	↓	9,4	6,2	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	4,5	1,9 *	↓	4,2	2,3	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	13,0	9,4	↓	12,9	9,0	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière pour cet indicateur.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


Consommation problématique d'alcool ou de drogues


Polyconsommateurs d'alcool et de drogues

Proportion des élèves du secondaire polyconsommateurs d'alcool et de drogues au cours des douze derniers mois selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	27,2	21,4 +	↓	25,1	13,9 -	↓
Garçons	28,7	23,5 +	ns	24,0	16,4	↓
Sexes réunis	28,0	22,4 +	↓	24,5	15,2 -	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	12,6 *	10,6 * +	ns	7,6 *	3,5 * -	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	39,9	31,9 +	↓	37,0	23,5	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	25,9	17,0	↓	24,0	17,8	↓
Garçons	25,9	18,7	↓	25,1	18,6	↓
Sexes réunis	25,9 +	17,9	↓	24,5	18,2	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	9,7	6,4 *	↓	10,3	6,2	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	38,2 +	26,7	↓	34,4	26,9	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.

Consommation problématique d'alcool ou de drogues

Conséquence négative associée à la consommation d'alcool ou de drogues

Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins une conséquence négative associée à leur consommation d'alcool ou de drogues, parmi ceux ayant consommé de l'alcool ou de la drogue au cours des douze derniers mois, selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	17,1	s.o.	nd	10,9 *	s.o.
Garçons	nd	18,6	s.o.	nd	15,4	s.o.
Sexes réunis	nd	17,8	s.o.	nd	13,2 -	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	14,8 *	s.o.	nd	5,2 ** -	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	18,9	s.o.	nd	15,4	s.o.

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	13,6	s.o.	nd	15,1	s.o.
Garçons	nd	16,7	s.o.	nd	16,1	s.o.
Sexes réunis	nd	15,1	s.o.	nd	15,6	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	9,7 *	s.o.	nd	12,9	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	16,8	s.o.	nd	16,4	s.o.

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l'édition 2016-2017

s.o. : sans objet car l'édition 2010-2011 n'est pas comparable avec l'édition 2016-2017

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018.


Consommation problématique d'alcool ou de drogues


Indice DEP-ADO feu vert


Proportion des élèves du secondaire ne démontrant aucun problème évident de consommation et pour qui il n'y a aucune intervention nécessaire (indice DEP-ADO feu vert) selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	88,9	92,5	ns	91,3	96,1	↑
Garçons	88,9	90,0	ns	89,8	93,8	↑
Sexes réunis	88,9	91,3	ns	90,5	94,9	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	94,2	95,5	ns	96,3	99,4	↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	84,7	87,9	ns	86,2	91,5	↑

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	90,3	94,6	↑	90,7	94,5	↑
Garçons	89,4	92,4	↑	89,0	93,2	↑
Sexes réunis	89,8	93,5	↑	89,8	93,8	↑
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	95,4	97,9	↑	95,2	97,7	↑
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	85,6	90,1	↑	86,1	91,0	↑

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.


Consommation problématique d'alcool ou de drogues


Indice DEP-ADO feu jaune


Proportion des élèves du secondaire présentant des problèmes en émergence et pour qui une intervention est souhaitable (indice DEP-ADO feu jaune) selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	5,5 *	3,8 *	ns	3,6 *	2,8 *	ns
Garçons	4,9 *	5,1 *	ns	4,4	3,1	↓
Sexes réunis	5,2	4,5	ns	4,0	3,0	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	2,2 **	np	nc	1,6 **	np	nc
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	7,5	np	nc	5,8	np	nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	4,4	3,2	ns	4,6	3,1	↓
Garçons	4,6	3,9	ns	5,5	3,4	↓
Sexes réunis	4,5	3,5	↓	5,1	3,3	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	1,9 *	1,0 **	↓	2,2	1,1	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	6,5	5,5	ns	7,0	4,9	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017, le 30 octobre et le 4 décembre 2018.


Consommation problématique d'alcool ou de drogues


Indice DEP-ADO feu rouge


Proportion des élèves du secondaire présentant des problèmes évidents de consommation d'alcool ou de drogues et pour qui une intervention spécialisée est nécessaire (indice DEP-ADO feu rouge) selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	5,6 *	3,7 * +	ns	5,1	1,1 ** -	↓
Garçons	6,2	4,9 *	ns	5,8 *	3,1 *	↓
Sexes réunis	5,9	4,3 * +	ns	5,5	2,1 *	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	3,5 *	np	nc	2,1 **	np	nc
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	7,8	np	nc	8,0 *	np	nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	5,3	2,2 *	↓	4,8	2,4	↓
Garçons	6,0	3,8	↓	5,5	3,4	↓
Sexes réunis	5,7	3,0	↓	5,1	2,9	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	2,7 *	1,2 **	↓	2,6	1,3	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	7,9	4,4	↓	6,8	4,1	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 30 octobre 2018.

L'usage des produits du tabac


usage des produits du tabac


usage de la cigarette à vie


Proportion de fumeurs actuels¹ de cigarette chez les élèves du secondaire selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	12,0 * +	5,7 * +	↓	9,1 +	2,3 **	↓
Garçons	8,0 *	7,1 * +	ns	6,6 *	3,3 *	↓
Sexes réunis	10,0 +	6,4 +	↓	7,9	2,8 *	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	5,3 **	3,1 **	ns	4,0 *	0,8 **	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	13,6 *	9,0 +	ns	10,7	4,3 *	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	10,3 +	3,7 +	↓	6,8	2,7	↓
Garçons	7,2	4,7 +	↓	7,0	3,4	↓
Sexes réunis	8,7 +	4,2 +	↓	6,9	3,1	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	4,5 *	1,7 **	↓	3,4	1,3	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	11,9 +	6,1 +	↓	9,3	4,3	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

¹ Fumeurs quotidiens ou occasionnels.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

ns : non significatif

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


usage des produits du tabac

usage de la cigarette au cours des 30 derniers jours


Proportion des élèves du secondaire ayant fait usage de produits du tabac¹ au cours des 30 derniers jours selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	13,7 +	s.o.	nd	6,3 * -	s.o.
Garçons	nd	15,7 +	s.o.	nd	8,5 -	s.o.
Sexes réunis	nd	14,6 +	s.o.	nd	7,4 -	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	8,8 * +	s.o.	nd	1,9 **	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	19,3 +	s.o.	nd	11,6 -	s.o.

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	9,3	s.o.	nd	9,3	s.o.
Garçons	nd	11,2	s.o.	nd	12,3	s.o.
Sexes réunis	nd	10,2	s.o.	nd	10,8	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	4,6 *	s.o.	nd	5,1	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	14,6	s.o.	nd	15,0	s.o.

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

¹ Fait référence à l'usage d'au moins un produit du tabac, soit la cigarette, le cigarillo ou le petit cigare ou de tout autre produit du tabac. Il exclut l'usage de la cigarette électronique.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSIS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

nd : donnée non disponible

s.o. : sans objet

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018.


usage des produits du tabac

usage du cigarillo et du petit cigare au cours des 30 derniers jours


Proportion des élèves du secondaire ayant fumé le cigarillo ou le petit cigare au cours des 30 derniers jours selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	11,7 +	s.o.	nd	5,3 * -	s.o.
Garçons	nd	14,3 +	s.o.	nd	7,4 -	s.o.
Sexes réunis	nd	13,0 +	s.o.	nd	6,4 -	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	9,1 * +	s.o.	nd	1,9 **	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	16,1 +	s.o.	nd	9,7 -	s.o.

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	7,9	s.o.	nd	8,0	s.o.
Garçons	nd	10,0	s.o.	nd	11,2	s.o.
Sexes réunis	nd	9,0	s.o.	nd	9,6	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	4,8 *	s.o.	nd	4,9	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	12,2	s.o.	nd	13,1	s.o.

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSIS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

nd : donnée non disponible

s.o. : sans objet

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018.

usage de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours


Proportion des élèves du secondaire ayant utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	10,4 +	s.o.	nd	6,3 *	s.o.
Garçons	nd	15,6	s.o.	nd	9,3 -	s.o.
Sexes réunis	nd	12,9 +	s.o.	nd	7,9 -	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	9,6 +	s.o.	nd	3,5 *	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	15,5	s.o.	nd	11,1 -	s.o.

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	8,0	s.o.	nd	8,2	s.o.
Garçons	nd	11,6	s.o.	nd	13,4	s.o.
Sexes réunis	nd	9,8	s.o.	nd	10,9	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	5,9	s.o.	nd	6,9	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	12,8	s.o.	nd	13,8	s.o.

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

nd : donnée non disponible

s.o. : sans objet

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018.


usage des produits du tabac


Âge d'initiation à la cigarette (12 ans)


Proportion des élèves du secondaire de 12 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 12 ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	7,2 * +	np	nc	4,2	np	nc
Garçons	7,1 * +	np	nc	4,2 *	np	nc
Sexes réunis	7,2 +	2,5 * +	↓	4,2	0,6 **	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	6,3 * +	np	nc	5,7 *	np	nc
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	7,8 * +	np	nc	3,1 *	np	nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	5,4 +	0,9 **	↓	3,2	0,7	↓
Garçons	5,4 +	1,8 *	↓	3,8	1,3	↓
Sexes réunis	5,4 +	1,3 *	↓	3,5	1,0	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	5,9 +	1,6 **	↓	3,9	1,0	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	5,0 +	1,2 *	↓	3,3	1,0	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité

np : donnée non présentée en raison des règles de masquage

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.


Usage des produits du tabac


Âge d'initiation à la cigarette (13 ans)


Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 13 ans selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 et 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	14,2 +	6,9 +	↓	9,8	1,5 **	↓
Garçons	12,4 +	6,4 * +	↓	10,0	3,5 *	↓
Sexes réunis	13,2 +	6,7 +	↓	9,9 +	2,5 *	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	13,8 +	7,9 * +	↓	11,9	1,4 **	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	12,9 +	5,9 +	↓	8,8	3,2 *	↓

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	11,5 +	3,7 +	↓	8,0	2,3	↓
Garçons	11,0 +	4,6 +	↓	8,2	2,8	↓
Sexes réunis	11,2 +	4,1 +	↓	8,1	2,5	↓
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	12,7 +	4,0 *	↓	9,4	2,8	↓
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	10,4 +	4,2 +	↓	7,5	2,4	↓

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et le Québec en 2010-2011 et de 1 % pour le Québec en 2016-2017.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 ou de l'EQSJS 2016-2017, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2010-2011, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 2010-2011 et 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 26 avril 2017 et le 4 décembre 2018.

Le sommeil


Sommeil

Nombre recommandé d'heures de sommeil


Proportion des élèves du secondaire ayant le nombre recommandé d'heures de sommeil pendant la semaine d'école¹ selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	70,3 +	s.o.	nd	66,0	s.o.
Garçons	nd	64,9	s.o.	nd	58,3	s.o.
Sexes réunis	nd	67,7 +	s.o.	nd	62,0	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	66,0	s.o.	nd	61,9	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	69,0 +	s.o.	nd	62,1	s.o.

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	67,8 +	s.o.	nd	63,3	s.o.
Garçons	nd	60,7	s.o.	nd	62,0	s.o.
Sexes réunis	nd	64,2	s.o.	nd	62,6	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	63,6	s.o.	nd	60,8	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	64,7	s.o.	nd	63,9	s.o.

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanadois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanadois et de 1 % pour le Québec.

¹ Il est recommandé que les enfants de 13 ans et moins dorment habituellement entre 9 et 11 heures la nuit. Chez les enfants de 14 à 17 ans, cette recommandation est entre 8 et 10 heures tandis que chez les personnes de 18 ans et plus, celle-ci est entre 7 et 9 heures (Traoré et autres, 2018).

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSIS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

nd : donnée non disponible

s.o. : sans objet

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018.

L'expérience de
travail et les
blessures liées à
l'emploi


Expérience de travail

Occupation d'un emploi


Proportion des élèves du secondaire occupant un emploi durant l'année scolaire selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	62,3	+	nd	56,0	s.o.
Garçons	nd	58,2	+	nd	41,7	s.o.
Sexes réunis	nd	60,3	+	nd	48,6	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	56,7	+	nd	44,0	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	63,2	+	nd	52,0	s.o.

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	58,6	+	nd	56,2	s.o.
Garçons	nd	47,8	s.o.	nd	49,0	s.o.
Sexes réunis	nd	53,2	s.o.	nd	52,6	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	49,1	s.o.	nd	47,7	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	56,4	s.o.	nd	56,1	s.o.

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

 Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l'édition 2016-2017

s.o. : sans objet

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018.

Proportion des élèves du secondaire occupant un emploi durant l'année scolaire à raison de 11 heures ou plus par semaine selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	24,5 +	s.o.	nd	18,2	s.o.
Garçons	nd	28,8	s.o.	nd	24,1	s.o.
Sexes réunis	nd	26,4 +	s.o.	nd	20,8 -	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	12,6 *	s.o.	nd	4,5 *	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	36,3	s.o.	nd	31,2	s.o.

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	20,9	s.o.	nd	20,9	s.o.
Garçons	nd	26,2	s.o.	nd	26,9	s.o.
Sexes réunis	nd	23,3	s.o.	nd	23,8	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	8,2	s.o.	nd	9,2	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	33,4	s.o.	nd	32,7	s.o.

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanadois et de 1 % pour le Québec.

Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanadois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSIS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l'édition 2016-2017

s.o. : sans objet

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 décembre 2018.

Expérience de travail

Consignes ou entraînement reçus sur la sécurité et les dangers au travail

Proportion des élèves du secondaire travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale qui ont reçu des consignes ou une formation sur la sécurité ou les dangers au travail afin d'éviter les blessures selon le sexe et le cycle scolaire, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	73,3	s.o.	nd	71,5	s.o.
Garçons	nd	73,9	s.o.	nd	71,3	s.o.
Sexes réunis	nd	73,6	s.o.	nd	71,4	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	72,3	s.o.	nd	63,4	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	74,2	s.o.	nd	73,7	s.o.

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	72,4	s.o.	nd	71,5	s.o.
Garçons	nd	72,5	s.o.	nd	73,1	s.o.
Sexes réunis	nd	72,5	s.o.	nd	72,3	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	68,5	s.o.	nd	67,2	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	73,9	s.o.	nd	74,2	s.o.

Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanaudois et de 1 % pour le Québec.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l'édition 2016-2017

s.o. : sans objet

Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018.

Blessures liées à l'emploi

Blessures durant l'emploi principal

Proportion des élèves du secondaire qui ont été blessés au travail dans leur emploi principal, parmi ceux travaillant pour un employeur ou pour l'entreprise familiale, selon le sexe et le cycle scolaire Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2016-2017 (%)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	14,4	s.o.	nd	12,5 *	s.o.
Garçons	nd	21,1	s.o.	nd	18,2 *	s.o.
Sexes réunis	nd	17,8	s.o.	nd	15,5	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	12,1	s.o.	nd	10,1 **	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	20,5	s.o.	nd	17,1 *	s.o.

	Lanaudière			Le Québec		
	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017	2010-2011	2016-2017	Comparaison 2010-2011 / 2016-2017
	%	%		%	%	
Filles	nd	13,5	s.o.	nd	16,1	s.o.
Garçons	nd	19,6	s.o.	nd	21,7	s.o.
Sexes réunis	nd	16,6 -	s.o.	nd	19,1	s.o.
1 ^{er} cycle (1 ^{re} et 2 ^e secondaire)	nd	11,2 -	s.o.	nd	15,2	s.o.
2 ^e cycle (3 ^e , 4 ^e et 5 ^e secondaire)	nd	18,6	s.o.	nd	20,5	s.o.

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

■ Différence significative entre les cycles scolaires, pour un même territoire, au seuil de 5 % pour les territoires lanauois et de 1 % pour le Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Sauf pour les cycles scolaires, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSIS 2016-2017 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

nd : donnée non disponible en raison des changements apportés au questionnaire de l'édition 2016-2017

s.o. : sans objet

Source : ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*.


Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec. Mise à jour le 30 octobre 2018.

Références bibliographiques

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, en collaboration avec l'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. *Guide spécifique des aspects méthodologiques des données d'enquêtes sociosanitaires du Plan national de surveillance – Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*, Québec, Gouvernement du Québec, 2018, 154 p.

PLANTE, Nathalie, Robert COURTEMANCHE et Mikaël BERTHELOT. *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. Résultats de la deuxième édition. Méthodologie de l'enquête et caractéristiques de la population visée, Tome 1*, Québec, Gouvernement du Québec, 2018, 54 p.

TRAORÉ, Issouf, Dominic JULIEN, Hélène CAMIRAND, Maria-Constanza STREET et Jasline FLORES. *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. Résultats de la deuxième édition. L'adaptation sociale et la santé mentale des jeunes, Tome 2*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 2018, 189 p.



Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Lanaudière

Québec 