

Guide d'investigation à l'usage des médecins pour la clientèle admissible à l'accueil clinique

GYNÉCOLOGIE

Critères généraux d'exclusion à une demande d'inscription à l'accueil clinique :

Usager présentant l'un des critères suivants :

- Rythme cardiaque \geq à 120/min.
- Rythme respiratoire \geq à 30/min.
- Pression artérielle \leq 90 mmHg ou \geq 200 mmHg
- Température \leq 35 °C ou \geq 40 °C
- SpO₂ < 90 %
- Altération de l'état de conscience
- Étourdissement associé à des saignements actifs

N° de référence d'investigation *	Diagnostic / symptômes subaigus observés	Critères spécifiques d'exclusion à une demande d'inscription à l'accueil clinique	Spécificités
GYN-1	Saignement postménopausique (aménorrhée depuis plus d'un an et présente saignement).	- Saignement anormal périménopausique; - Anémie sévère : Hb \leq 80 g/L; - Saignement abondant (> 1 serviette sanitaire à l'heure).	
GYN-2	Saignement sans douleur 1 ^{er} trimestre.	- Saignement abondant (> 1 serviette sanitaire aux 3 h); - Douleur peu importe l'intensité; - Température buccale \geq 38 °C; - Saignement \geq 14 semaines de grossesse; - Demande les vendredis après 12 h, samedi et dimanche.	- Critère d'inclusion : absence de douleur à l'histoire et à l'examen.
GYN-3	Masse annexielle	- Exclure grossesse, grossesse ectopique; - Maladie inflammatoire pelvienne; - Douleur intense non soulagée par analgésie; - Température \geq 38 °C; - Signes infectieux.	- Préciser sur la demande d'inscription de l'accueil clinique si usagère est ménopausée ou préménopausée.

IMPORTANT : En présence d'une complication postopératoire, le médecin avise, sans délai, le gynécologue-obstétricien qui a effectué la chirurgie. Si ce dernier est non disponible, il avise le gynécologue-obstétricien de garde.

* Le numéro de référence d'investigation correspond à l'ordonnance collective 4.25 du CSSSNL.


GYNÉCOLOGIE GYN-1 SAIGNEMENT POSTMÉNOPAUSIQUE (AMÉNORRHÉE DEPUIS PLUS D'UN AN ET PRÉSENTE SAIGNEMENT)

Contre-indication :

Si depuis la réception de la référence médicale, l'usagère présente l'une des conditions suivantes :

- Hb \leq 80 g/L;
- Saignement abondant (> 1 serviette sanitaire à l'heure).

À faire si usagère anticoagulée ←




GYNÉCOLOGIE GYN-2 SAIGNEMENT SANS DOULEUR 1^{ER} TRIMESTRE

Contre-indication :

Si depuis la réception de la référence médicale, l'usagère présente l'une des conditions suivantes :

- Saignement abondant (> 1 serviette sanitaire aux 3 heures);
- Douleur peu importe l'intensité;
- Température buccale ≥ 38 °C;
- Saignement ≥ 14 semaines de grossesse;
- Demandes reçues les vendredis après 12 h, les samedis et les dimanches.



GYNÉCOLOGIE GYN-3 MASSE ANNEXIELLE

Contre-indication :

Si depuis la réception de la référence médicale, l'usagère présente l'une des conditions suivantes :

- Douleur intense non soulagée par analgésique;
- Température $\geq 38^{\circ}\text{C}$;
- Exclure grossesse.

