

## ACCUEIL CLINIQUE SUD : MÉDECINE INTERNE

### Oligoarthrite et polyarthrite

**Le médecin référent : FSC, CRP, Sédimentation, Glycémie, Créatinine, Acide Urique, bilan hépatique, facteur rhumatoïde, anti-CCP**

#### Critères d'inclusion pour référence à l'accueil clinique :

- Faire l'évaluation initiale;
- Oligoarthrite ou polyarthrite de novo (au moins 2 articulations atteintes).
- Syndrome inflammatoire (au moins un des deux critères ou les deux) :
  - CRP plus grande que 5 mg/L;
  - Vitesse de sédimentation plus grande que 20 mm/h.

#### Critères d'exclusion de référence à l'accueil clinique :

- Vérifier la présence de contre-indication à l'application du protocole :
  - Usage âgé de moins de 18 ans.
  - Usager déjà suivi en médecine interne ou en rhumatologie pour une arthrite inflammatoire chronique :
    - Rediriger l'usager vers son médecin traitant habituel : le médecin traitant doit acheminer une demande de consultation au CRDS ou contacter directement le médecin traitant habituel.
  - Suspicion d'arthrite septique : frissons solennels, fièvre supérieure à 38,3° C buccale, léthargie :
    - Référer directement l'usager à l'urgence.

Si absence de critères d'exclusion, référence à l'accueil clinique.

Procéder à l'évaluation de l'usager par l'infirmière de l'accueil clinique.

Absence de contre-indication.

Référence en médecine interne dans les 4 semaines.  
Si le délai ne peut être respecté, procéder à la réévaluation de l'usager.

À la suite de l'évaluation du spécialiste, procéder à la fermeture du dossier de l'accueil clinique et acheminer un résumé au médecin référent.

N.B. : Les références pour monoarthrite (i.e. une seule articulation atteinte) ne sont plus acceptées via l'accueil clinique. Les cas de monoarthrites inflammatoires doivent être discutés directement avec l'interniste de garde afin de planifier une consultation dans un délai approprié si nécessaire, ou une consultation au CRDS peut être demandée pour les cas de monoarthrite récurrente (goutte, pseudogoutte, suspicion d'une arthrite inflammatoire primaire, etc.)