

## ACCUEIL CLINIQUE SUD : MÉDECINE INTERNE Thrombose veineuse

LES DEMANDES SONT ACCEPTÉES LES JOURS OUVRABLES SEULEMENT (LE VENDREDI JUSQU'À 8 H 00)

### Critère

- Faire l'évaluation initiale.
- Vérifier la présence de contre-indication à l'application du protocole :
  - Usager âgé de moins de 18 ans;
  - Température supérieure ou égale à 38,3° buccale;
  - Dyspnée de novo;
  - Douleur thoracique pleurétique nouvelle;
  - Tachycardie (FC plus grande ou égale à 100 bpm);
  - Tachypnée (FR plus grande que 22 respirations par minute);
  - Hypoxémie (Saturation inférieure à 92 % AA).
- Considérer un traitement empirique selon le degré de suspicion clinique.

Référence à l'accueil clinique.

Procéder à l'évaluation initiale par l'infirmière de l'accueil clinique.

Absence de contre-indication.

Doppler veineux dans les 24 heures à la suite de l'évaluation initiale.  
Si le délai d'imagerie ne peut être respecté, procéder à la réévaluation de l'usager.

**Thrombose veineuse profonde** (peu importe la localisation ou l'extension).

**Thrombose veineuse superficielle** qui s'étend à 3 cm ou moins de la jonction avec réseau veineux profond (clarifier au besoin avec le radiologiste).

**Absence de thrombose veineuse** correspondant aux critères ci-contre.

**Thrombose veineuse superficielle**  
(Longueur de 5 cm ou plus).

**Thrombose des veines musculaires du mollet.**

Consultation en médecine interne dès la réception du résultat.

Procéder à la fermeture du dossier de l'accueil clinique et acheminer un résumé au médecin requérant.