


Le médecin requérant prescrit le prélèvement suivant pour **le lendemain si le patient est sous NACO** → Créatinine
Dans ce cas, le poids et la taille doivent être inscrits sur le formulaire de demande de rendez-vous à l'accueil clinique (#333000663)

Dans un délai de 24 à 72 heures ouvrables :

- Procéder à l'évaluation initiale
- Vérifier la présence de contre-indication:
 - Dyspnée
 - Tirage
 - Température > 37,0 °C
 - Respiration > 22/min
 - Fréquence cardiaque > 100/min
 - Saturation < 92 %



- Demander une ponction pleurale diagnostique en imagerie (≤ 7 jours)
 - Ne pas cesser Plavix, ASA, Brilinta ou Efient
 - Si le patient prend du Fragmin, ne doit **pas** être pris le matin de la ponction pleurale
 - Si le patient prend du Coumadin, demander une consultation en pneumologie AVANT de demander la ponction pleurale diagnostique (le pneumologue prescrira celle-ci si requise).

- Le patient prend un NACO

	Si Clcr	Dabigatran	Rivaroxaban	Apixaban
	>50 ml/min	cesser 1 jour	cesser 1 jour	cesser 1 jour
	31-50 ml/min	cesser 2 jours	cesser 1-2 jours	cesser 1-2 jours
	< ou égal 30 ml/min	cesser 4 jours	cesser 2 jours	cesser 2 jours

- Procéder aux prélèvements sanguins suivants **le même jour que la ponction pleurale DIAGNOSTIQUE** : Protéine totale, albumine, LDH, glucose, FSC, INR, PTT, CRP, Électrolytes, Ca, ALT, phosphatase alcaline, créatinine
- Aviser si le liquide pleural indique un PH 7,30 et absence de glucose
- Demander une consultation en pneumologie APRÈS la ponction pleurale (délai 1 semaine)
- Procéder à la réévaluation si les délais ne sont pas respectés

- Appliquer les prescriptions du spécialiste (au besoin)
- Procéder à la fermeture du dossier de l'accueil clinique et acheminer un résumé au médecin requérant