

ACCUEIL CLINIQUE SUD UROLOGIE

URO : LITHIASÉ URINAIRE

***LE SOULAGEMENT DE LA DOULEUR DOIT ÊTRE ASSURÉ PAR LE MÉDECIN REQUÉRANT**
(analgésique, narcotique, anti-inflammatoire) et Flomax si pas de contre-indication 6 à 8 semaines)

Le médecin requérant prescrit les prélèvements suivants pour le **lendemain** :

- FSC, électrolytes, créatinine, INR, PTT
- BHCG (femme en âge de procréer)
- Analyse et culture d'urine

Dans un délai de 24-72 heures ouvrables:

- Faire l'évaluation initiale
- Vérifier la présence de contre-indication à l'application du protocole :
 - Créatinine au-dessus de la limite supérieure
 - Douleur intense non soulagée par analgésie
 - Température $\geq 38,5$ °C buccale
 - Femme enceinte
 - Rein unique
- Aviser le client de filtrer ses urines

Présence de contre-indication(s)

Absence de contre-indication

Diriger le client vers l'urgence
ou aviser le médecin requérant

Aviser médecin requérant :

- Leucocytes > 10 cell./champ ou si nitrites positives (urinaire)
- Créatinine > 120 $\mu\text{mol/L}$ (sanguin)
- Augmentée par rapport à la valeur de base chez IRC

Uroscan + PSA (Délai < 24 heures ouvrables)
(si uroscan antérieur < 1 mois, ne pas le refaire)

Lithiase ≥ 5 mm Délai : 1 sem.
Lithiase < 5 mm Délai : ≤ 2 sem.
Lithiase calicelle asymptotique Délai : ≤ 3 mois
Procéder à la réévaluation du client lorsque les délais ne
sont pas respectés et au PRN

Consultation en urologie (PSA le jour de la consultation)

Résultat négatif

- Appliquer les prescriptions du spécialiste (au besoin)
- Procéder à la fermeture du dossier de l'accueil clinique et acheminer un résumé au médecin requérant