

## ORDONNANCE COLLECTIVE

<b>ORDONNANCE :</b> Administration de médication péri intervention en ophtalmologie.		<b>NUMÉRO : 1.24</b>
		<b>DATE : Décembre 2007</b>
		<b>RÉVISÉE : Juin 2013</b>
<b>PROFESSIONNELS VISÉS</b>	▪ Infirmières ▪ Orthoptiste	<b>Référence à un protocole</b>
<b>TYPE D'ORDONNANCE</b>	Ordonnance visant à <b>initier</b> des mesures thérapeutiques.	Non

### PROFESSIONNELS HABILITÉS

- Infirmières
- Orthoptiste

### CLIENTÈLES VISÉES

- Les usagers devant subir ou ayant subi une intervention en ophtalmologie.

### UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS

- La clinique externe d'ophtalmologie du CHRDL

### ACTIVITÉS RÉSERVÉES

#### INFIRMIÈRES

- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

#### ORTHOPTISTE

- Appliquer des collyres ou des onguents à des fins thérapeutiques
- Instiller des collyres à des fins diagnostiques.

## 1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE

- Administrer la médication en péri intervention ophtalmologique.

## 2. CONDITION D'INITIATION

- Pour les usagers vus à la clinique d'ophtalmologie en pré et post intervention énumérées dans l'ordonnance et selon l'ophtalmologiste concerné.
- **En l'absence d'ordonnance individuelle au dossier.**

## 3. ORDONNANCE

- Administrer la médication selon le **TABLEAU EN ANNEXE**

## 4. CONDITIONS D'APPLICATION

### 4.1. Indications

Pour les interventions ophtalmologiques suivantes :

- Cataractes
- Trabéculéctomie et trabéculoplastie
- Capsulotomie
- Iridotomie et iridoplastie
- Photocoagulation de la rétine
- Section bande vitrée
- Pupilloplastie
- Traitement au laser
- Injection de médication intra vitréenne

### 4.2. Contre-indications

- Hypersensibilité ou allergie à la médication.

## 5. MÉTHODES

### 5.1. Précautions et directives

- Pour tout autre ophtalmologiste, attendre l'ordonnance individuelle.

### 5.2. Procédures

- Méthode de soins informatisée de l'AQESSS :  
«Administration d'un médicament par voie ophtalmique»

### **5.3. Éléments de surveillance**

- Signes d'intolérance ou d'allergie à la médication

### **5.4. Complications**

- N.A.

### **5.5. Limites d'application**

- Aviser l'ophtalmologiste s'il est impossible d'instaurer le traitement.

## **6. SOURCE**

- Consensus des signataires

**Administrer 1 goutte de chaque solution inscrite dans l'œil affecté pour l'intervention effectuée et selon la période désignée.**


AVANT : Minimum 15 minutes avant l'intervention


SOLUTIONS OPHTALMIQUES		Dr Lor	Dr Mayer	Dr Deschênes	Dr Jeanson	Dr Yu
<b>POST-OP CATARACTE + TRABÉCULECTOMIE</b>						
	Atropine 1 %		✓			
	Cocaïne 5 % avant injection 5FU		✓			
<b>POST-OP CATARACTE DE L'ŒIL OPÉRÉ</b>						
	Atropine 1 %		✓			
<b>LASER DES 2 YEUX</b>						
<b>CAPSULOTOMIE</b>						
Avant	Tropicamide 0,5 %-Phényléphrine 5 %	✓	✓	✓	✓	✓
Avant	Apraclonidine 0,5 % (lopidine)	✓				
Après	Apraclonidine 0,5 % (lopidine)		✓	✓	✓	✓
<b>IRIDOTOMIE</b>						
Avant	Pilocarpine 2 %	✓	✓	✓	✓	✓
Avant	Apraclonidine 0,5 % (lopidine)	✓				
Après	Apraclonidine 0,5 % (lopidine)		✓	✓	✓	✓
<b>TRABÉCULOPLASTIE</b>						
Avant	Pilocarpine 2 % + Apraclonidine 0,5 % (lopidine)	✓	✓	✓		✓
Avant	Pilocarpine 2 %				✓	
Après	Dexaméthasone 0,1 % (Maxidex) + Apraclonidine 0,5 % (lopidine)	✓				✓
Après	Dexaméthasone 0,1 % (Maxidex)		✓			
Après	Betoptic S 0,25 % (Betaxolol)			✓		
Après	Apraclonidine 0,5 % (lopidine)				✓	
<b>PHOTOCOAGULATION PANRÉTINIENNE (PRP) ET LOCALE (PCA)</b>						
Avant	Tropicamide 0,5 % / Phényléphrine 5 % + Tropicamide 1 % (Mydriacyl)	✓	✓	✓	✓	✓
Après	Dexaméthasone 0,1 % (Maxidex)		✓			
<b>SECTION BANDE VITRÉE</b>						
Avant	Pilocarpine 2 %	✓	✓	✓	✓ prn	✓
Après	Dexaméthasone 0,1 % (Maxidex) + Apraclonidine 0,5 % (lopidine)	✓				✓
Après	Dexaméthasone 0,1 % (Maxidex)		✓			
Après	Betoptic S 0,25 % (Betaxolol)			✓		
Après	Apraclonidine 0,5 % (lopidine)				✓	
<b>PUPILLOPLASTIE OU IRIDOPLASTIE</b>						
Avant	Pilocarpine 2 %	✓	✓	✓	✓	✓
Après	Dexaméthasone 0,1 % (Maxidex) + Apraclonidine 0,5 % (lopidine)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>LASER VX CONJONCTIVAL</b>						
Avant	Cocaïne 5 %	✓	✓			
Après	Dexaméthasone 0,1 % (Maxidex)	✓	✓			
<b>INJECTION KENALOG OU AVASTIN INTRAVITRÉEN</b>						
Avant	Tropicamide 0,5 % / Phényléphrine 5 %			✓		
Avant	Tropicamide 0,5 % / Phényléphrine 5 % + Apraclonidine 0,5 %				✓	
Avant	Alcaïne 0,5 % (Proparacaine)			✓	✓	
Avant	Tétracaine 0,5 %	✓		✓	✓	✓

## ORDONNANCE COLLECTIVE


<b>ORDONNANCE :</b> Administration de médication péri intervention en ophtalmologie.	<b>NUMÉRO : 1.24</b>
	<b>DATE : Décembre 2007</b>
	<b>RÉVISÉE : Juin 2013</b>

Médecin ophtalmologiste prescripteur :   
Date : 2013-08-19 Dr Pierre Jeanson


Médecin ophtalmologiste prescripteur :   
Date : 2013-08-20 Dr Daniel Yu


Médecin ophtalmologiste prescripteur :   
Date : 2013-08-26 Dr Huy Sroy


Médecin ophtalmologiste prescripteur :   
Date : 12/12/2013 Dr Jean Mayer


Chef du service de d'ophtalmologie :   
Date : 2013-08-23 Dr Christian Deschênes

Chef du département de chirurgie :   
Date : 2013/8/23 Dr Michel Dunberry

Chef du département de pharmacie :   
Date : 22/8/2013 Guylaine Ladouceur

Directeur des soins infirmiers :   
Date : 2013-08-26 Robin Bagnon

Directeur des services multidisciplinaires :   
Date : 13 Août 2013 Jean-Yves Tremblay

Adoptée par le CMDP :   
Date : 2013/10/16