

ORDONNANCE COLLECTIVE

ORDONNANCE : Application d'un analgésique topique EMLA pour le contrôle de la douleur dans le traitement des plaies.		NUMÉRO : 6.10
		DATE : Mai 2007
		RÉVISÉE :
PROFESSIONNELS VISÉS	Infirmières	Référence à un protocole
TYPE D'ORDONNANCE	Ordonnance visant à initier des mesures thérapeutiques.	Oui
		Protocole infirmier de soins de plaies

PROFESSIONNELS HABILITÉS

- Infirmières

CLIENTÈLES VISÉES

- Les usagers présentant tout type de plaies

SAUF : plaies chirurgicales récentes (< 1 mois)

UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS

- CSSSNL

ACTIVITÉS RÉSERVÉES

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.
- Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s'y rattachent.

1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE

- Prévenir ou contrôler la douleur ressentie par l'utilisateur pendant une intervention.

2. CONDITION D'INITIATION

- En prévision d'une intervention habituellement douloureuse pour l'utilisateur.

3. ORDONNANCE

- Appliquer une mince couche de crème sur la région à anesthésier au moins 30 à 60 minutes avant l'intervention à pratiquer.
- Dose maximale par application: 10 g

4. CONDITIONS D'APPLICATION

4.1. Indications

- Interventions potentiellement douloureuses :
 - Débridement chirurgical
 - Débridement mécanique
 - Réfection de pansement
 - Autres

4.2. Contre-indications

- Sensibilité connue aux anesthésiques locaux de type amide.
- Enfants de moins d'un an
- Utiliser avec prudence pendant les premiers mois de grossesse

5. MÉTHODES

5.1. Précautions et directives

- 1 g de crème EMLA équivaut à un ruban de crème de 3.5 cm.
- Recouvrir la région anesthésiée d'une pellicule plastique.
- Laisser en place jusqu'à 60 minutes pour les tissus nécrosés dont la barrière de pénétration est plus épaisse.
- Enlever la crème avant l'intervention à pratiquer.

5.2. Procédures

- Selon le protocole infirmier de soins de plaies

5.3. Éléments de surveillance

- Effets indésirables au site d'application:
 - Léger érythème (fréquent)
 - Faible œdème
 - Légère irritation

5.4. Complications

- N.A.

5.5. Limites d'application

- N.A.

