



## ORDONNANCE COLLECTIVE

<b>ORDONNANCE :</b> Demander un test de dépistage RSV/Influenza		<b>NUMÉRO : 4.12</b>
		<b>DATE :</b> Mai 2010
		<b>RÉVISÉE :</b>
<b>PROFESSIONNELS VISÉS</b>	Infirmières Inhalothérapeutes	<b>Référence à un protocole</b>
<b>TYPE D'ORDONNANCE</b>	Ordonnance visant à <b>initier</b> des mesures diagnostiques.	Non

### PROFESSIONNELS HABILITÉS

- Infirmières.
- Les inhalothérapeutes procèdent au prélèvement après évaluation de l'infirmière.

### CLIENTÈLE VISÉE

- Les enfants de 0 à 5 ans.

### UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS

- L'unité de pédiatrie.
- La clinique externe de pédiatrie.
- L'Urgence.

### ACTIVITÉS RÉSERVÉES

#### INFIRMIÈRES

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.

#### INHALOTHÉRAPEUTES

- Introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique ou dans une ouverture artificielle ou dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal.

## 1. INTENTIONS THÉRAPEUTIQUES

- Statuer rapidement sur le portrait viral de l'enfant.
- Diminuer les risques de contagion.

## 2. CONDITIONS D'INITIATION

- Hospitalisation demandée à l'unité de pédiatrie.
- Diagnostic médical avec possibilité de bronchiolite, IVRS, pneumonie.
- Présence de 2 critères sur 5 chez l'enfant (voir indications).

## 3. ORDONNANCE

- Demander un test de dépistage RSV (virus respiratoire syncytial)/Influenza

## 4. CONDITIONS D'APPLICATION

### 4.1. Indications

- Présence de 2 critères sur 5
  - Température
  - Présence de sécrétions
  - Toux
  - Tirage
  - Diminution de la saturation en oxygène

### 4.2. Contre-indication

- Présence de risques liés à la technique d'aspiration naso-pharyngée.

## 5. MÉTHODES

### 5.1. Précautions et directives

- Si possible, faire le prélèvement avant le transfert à l'unité de pédiatrie.
- Effectuer le test selon les disponibilités du technologiste médical au laboratoire.
- Inscire la demande du test au nom du médecin de garde en pédiatrie.

## **5.2. Procédure**

- Selon la technique en vigueur au CSSSNL.

## **5.3. Élément de surveillance**

- Vérifier le résultat dans les délais requis.

## **5.4. Complication**

- N.A.

## **5.5. Limite d'application**

- N.A.

## **6. SOURCES**

- Consensus des signataires.
- Up to date (2010), *Respiratory syncytial virus infection : Clinical features and diagnosis*, 8 pages.

## **PERSONNES CONSULTÉES**


- Éline Hamelin, chef du module parents-enfant et de la pédiatrie
- Lyne Périgny, conseillère clinicienne en soins infirmiers

## ORDONNANCE COLLECTIVE

<b>ORDONNANCE :</b> Demander un test de dépistage RSV/Influenza	NUMÉRO : 4.12
	DATE : Mai 2010
	RÉVISÉE :


Chef du département de pédiatrie : \_\_\_\_\_

Date : 2010-06-17

  
Dr. Youssef Khabazeh


Directeur des soins infirmiers : \_\_\_\_\_

Date : 2010-07-05

  
Martin Labrie


Directeur des services multidisciplinaires : \_\_\_\_\_

Date : 2010-07-21

  
Robert Vachon

Adoptée par le CMDP : \_\_\_\_\_

Date : 2010-09-15

  
Jean-Jacques Klopferstein, M.B., président