

## ORDONNANCE COLLECTIVE

<b>ORDONNANCE :</b> Administration de la Nitroglycérine en pompe pour le soulagement de la douleur angineuse.		<b>NUMÉRO :</b> 1.22
		<b>DATE :</b> Août 2007
		<b>RÉVISÉE :</b>
<b>PROFESSIONNELS VISÉS</b>	Infirmières	<b>Référence à un protocole</b>
<b>TYPE D'ORDONNANCE</b>	Ordonnance visant à <b>initier</b> la thérapie médicamenteuse.	Non

### PROFESSIONNELS HABILITÉS

- Infirmières
- Les infirmières auxiliaires sont autorisées à contribuer à l'application de cette ordonnance après évaluation par l'infirmière.

### CLIENTÈLES VISÉES

- Usagers hébergés ou hospitalisés dans les unités ou services concernés

### UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS

- Tous les centres d'hébergement et les ressources intermédiaires d'hébergement
- CHRDL :
  - Les unités de soins de longue durée psychiatriques
  - Les unités de soins de courte durée psychiatriques **adultes**

### ACTIVITÉS RÉSERVÉES

#### INFIRMIÈRES

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

#### INFIRMIÈRES AUXILIAIRES

- Contribuer à l'évaluation de l'état de santé d'une personne.
- Administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

## 1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE

- Antiangineux pour le soulagement de la douleur ou de l'inconfort associé aux crises d'angine.

## 2. CONDITION D'INITIATION

- Usager présentant une douleur rétrosternale/précordiale suggestive d'insuffisance coronarienne.

## 3. ORDONNANCE

- Administrer Nitroglycérine en pompe 0.4 mg sur ou sous la langue
- Répéter 2 fois à 5 à 10 minutes d'intervalles, si non soulagé
- **Signes vitaux :**
  - Avant 1<sup>ère</sup> dose
  - 5 minutes après chaque dose

## 4. CONDITIONS D'APPLICATION

### 4.1. Indications

- Soulagement des crises aiguës d'angine. Que l'usager soit déjà diagnostiqué comme insuffisant coronarien ou non.

### 4.2. Contre-indications

- Hypersensibilité connue à la nitroglycérine
- Hypotension

## 5. MÉTHODES

### 5.1. Précautions et directives

- Faire décrire à l'usager la douleur ressentie selon les critères d'évaluation d'une douleur.
- Observer les signes et symptômes accompagnant la douleur.
- Installer l'usager en position assise ou couchée.
- Si la tension artérielle est basse (systolique <100 mmHg) mais normale pour l'usager, administrer une première dose et évaluer la réaction de l'usager.
- Ne pas répéter la dose si l'usager présente une chute de pression importante, de la tachycardie, des céphalées.

## **5.2. Procédures**

- Méthodes de soins de l'AQESS :
  - «Administration de nitroglycérine par pompe»
  - «Contrôle de la douleur»

## **5.3. Éléments de surveillance**

- Signes vitaux après chaque dose de nitroglycérine
- Niveau de soulagement de la douleur

## **5.4. Complications**

- Hypotension sévère
- Dommage ischémique au muscle cardiaque

## **5.5. Limites d'application**

- Aviser le médecin traitant si :
  - il est impossible d'instaurer le traitement
  - douleur persiste malgré interventions effectuées
  - hypotension sévère post administration de nitroglycérine

## ORDONNANCE COLLECTIVE

<b>ORDONNANCE :</b> Administration de la Nitroglycérine en pompe pour le soulagement de la douleur angineuse.	<b>NUMÉRO :</b> 1.22
	<b>DATE :</b> Août 2007
	<b>RÉVISÉE :</b>

Chef du département de médecine générale : Helene Laporte  
Date : 01-11-2007  
Dr Helène Laporte

Chef du département de psychiatrie : Dr Michel Bil  
Date : 20/11/07  
Dr Michel Bil

Chef du département de pharmacie : Claude Gravel  
Date : 2008-01-16  
par entente Claude Gravel

Directeur des soins infirmiers : Donald Haineault  
Date : 30 janvier 2008  
Donald Haineault

Adoptée par le CMDP : Paul Allard  
Date : 2008-02-13  
PAUL ALLARD, MD, PRÉSIDENT