

## ORDONNANCE COLLECTIVE

<b>ORDONNANCE :</b> Application de cadexomère d'iode ( <b>Iodosorb</b> ) pour le traitement d'une plaie		<b>NUMÉRO : 6.07</b>
		<b>DATE :</b> Mai 2007
		<b>RÉVISÉE :</b>
<b>PROFESSIONNELS VISÉS</b>	Infirmières	<b>Référence à un protocole</b>
<b>TYPE D'ORDONNANCE</b>	Ordonnance visant à <b>initier</b> des mesures thérapeutiques.	Oui
		Protocole infirmier de soins de plaies

### PROFESSIONNELS HABILITÉS

- Infirmières

### CLIENTÈLES VISÉES

- Les usagers, **âgés de 14 ans et plus**, présentant tout type de plaies

**SAUF :** plaies chirurgicales récentes (< 1 mois)

### UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS

- CSSSNL

### ACTIVITÉS RÉSERVÉES

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.
- Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s'y rattachent.

## 1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE

- Optimiser le traitement des plaies.

## 2. CONDITION D'INITIATION

- Présence d'une plaie chronique avec ou sans signes d'infection.

## 3. ORDONNANCE

- Appliquer le cadexomère d'iode (**Iodosorb**) selon les recommandations du fabricant.

## 4. CONDITIONS D'APPLICATION

### 4.1. Indications

- Plaies infectées
- Plaies chroniques
- Plaies sans progression de la cicatrisation

### 4.2. Contre-indications

- Sensibilité connue ou soupçonnée à l'iode
- Affections thyroïdiennes
- Chez les femmes enceintes ou qui allaitent

## 5. MÉTHODES

### 5.1. Précautions et directives

- L'iode peut être absorbé par voie systémique si les plaies traitées sont étendues.
- Ne pas appliquer en concomitance avec des antiseptiques mercuriels ou de chlorexidine.
- Une même application ne doit pas dépasser 50 g et la dose hebdomadaire totale est de 150 g.

### 5.2. Procédures

- Selon les fiches descriptives annexées au protocole infirmier de soins de plaies

### **5.3. Éléments de surveillance**

- Évolution de la plaie

### **5.4. Complications**

- Réaction allergique

### **5.5. Limites d'application**

- Durée maximale du traitement : 3 mois

## ORDONNANCE COLLECTIVE

<b>ORDONNANCE :</b> Application de cadexomère d'iode (Iodosorb) pour le traitement d'une plaie	<b>NUMÉRO :</b> 47 6.07
	<b>DATE :</b> Mai 2007
	<b>RÉVISÉE :</b>

Chef du département de médecine générale: Hebert  
Date: 14/12/07 Dr Hélène Hébert

Chef du département de médecine spécialisée: J.B.  
Date: 08/02/08 Dr Jean-François Boisvert

Chef du département de chirurgie: Martel  
Date: 08/02/14 Dr Elise Martel

Chef du département de pédiatrie: N.A.  
Date: \_\_\_\_\_

Chef du département de pharmacie: Gravel  
Date: 22/03/2008 Claude Gravel

Directeur des soins infirmiers: Haineault  
Date: 2008-04-30 Donald Haineault

Adoptée par le CMDP: Paul Allard  
Date: 2008-5-14