

## ORDONNANCE COLLECTIVE

<b>ORDONNANCE :</b> Demander une culture de gorge pour <b>Streptest</b> à l'Urgence.		<b>NUMÉRO : 4.31</b>
		<b>DATE :</b> Mai 2013
		<b>RÉVISÉE :</b>
<b>PROFESSIONNELS VISÉS</b>	Infirmières	<b>Référence à un protocole</b>
<b>TYPE D'ORDONNANCE</b>	Ordonnance visant à <b>initier</b> des mesures diagnostiques.	Non

### PROFESSIONNELS HABILITÉS

- Infirmières au triage

### CLIENTÈLES VISÉES

- Usagers, **âgés de 3 ans et plus**, inscrit à l'Urgence, présentant une douleur à la gorge.

### UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS

- L'Urgence du CHRDL

### ACTIVITÉS RÉSERVÉES

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.

## 1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE

- Accélérer la prise en charge et le suivi au triage.
- Accélérer le dépistage d'une infection à streptocoque du groupe A.

## 2. CONDITION D'INITIATION

- Usager présentant une douleur à la gorge.
- Ordonnance valide durant les heures où l'analyse du Streptest est effectuée au laboratoire.

## 3. ORDONNANCE

- Effectuer une culture de gorge pour Streptest.

## 4. CONDITIONS D'APPLICATION

### 4.1. Indications

- Pointage  $\geq 2$  à l'échelle de douleur à la gorge (sore throat score)

### 4.2. Contre-indications

- Niveau de triage 1 ou 2
- Chirurgie récente (< 1 mois) au niveau de la bouche ou de la gorge
- Prélèvement de la gorge déjà effectué dans les 7 derniers jours
- Usager qui refuse ou qui ne collabore pas au prélèvement au triage

## 5. MÉTHODES

### 5.1. Précautions et directives

- Déterminer le résultat total des points accumulés sur l'échelle de la douleur à la gorge (sore throat score)

Critères	Points
Température > 38°C	1
Absence de toux	1
Sensibilité, œdème des ganglions cervicaux antérieurs	1
Œdème des amygdales ou présence d'exsudat ou de pus	1
Âge 3 -14 ans	1
Âge 15 - 44 ans	0
Âge $\geq 45$ ans	-1

- Selon le pointage obtenu, évaluer si une culture de gorge (Streptest) est requise.

Pointage	Risque d'une infection à streptocoque (%)	Intervention
-1 ou 0	1 - 2.5	Pas de culture
1	5 - 10	
2	11 - 27	Culture requise
3	28 - 35	
4 ou plus	51 - 53	Culture requise

## **5.2. Procédures**

- Selon la «Procédure d'initiation et de suivi d'une ordonnance collective diagnostique laboratoire au triage» de l'Urgence.

### **CSSSNL, *Le pré-analytique : Répertoire des analyses et des services***

(mise à jour le 12-04-04)

- Prélever 2 écouvillons chez les usagers de 15 ans et moins (Streptest et culture)
- Prélever 1 écouvillon chez les usagers de plus de 15 ans (Streptest)
- Méthodes de soins de l'AQESS :  
«Prélèvement des sécrétions de la gorge»

## **5.3. Éléments de surveillance**

- Résultat du Streptest

## **5.4. Complications**

- N.A.

## **5.5. Limites d'application**

- Référer au médecin de garde pour toute ambiguïté.

## **6. SOURCES**

- Consensus des signataires
- Cité de la Santé de Laval (2006), «*L'infirmière contemporaine à l'Urgence*», Projet d'implantation, 3<sup>e</sup> version, section «Problèmes respiratoires».
- Warren J. et al. (1998) *A clinical score to reduce unnecessary antibiotic use in patients with sore throat*, Canadian Medical Association Journal, 13 janvier, 158(1), pages 75-83.

## ORDONNANCE COLLECTIVE

<b>ORDONNANCE :</b> Demander une culture de gorge pour <b>Streptest</b> à l'Urgence.	<b>NUMÉRO :</b> 4.31
	<b>DATE :</b> Mai 2013
	<b>RÉVISÉE :</b>

Chef du département de médecine d'urgence : Judith Benoit  
Date : 31 mai 2013 Dr Frédéric Brizard

Directeur des soins infirmiers : Robin Gagnon  
Date : 2013-05-24 Robin Gagnon

Adoptée par le CMDP : [Signature]  
Date : 2013/06/12