

<b>ORDONNANCE COLLECTIVE</b>	INITIER L'ATROPINE EN POSTOPÉRATOIRE EN PRÉSENCE DE BRADYCARDIE OU D'ASYSTOLIE	<b>NO : OC-2-B-EA-K</b> (temp : 1.09)
<b>Référence:</b> <input type="checkbox"/> protocole thérapeutique <input type="checkbox"/> protocole de soins infirmiers	<input type="checkbox"/> règle de soins infirmiers <input type="checkbox"/> protocole clinique interdisciplinaire	<b>Mise en vigueur le :</b> <u>Décembre 2007</u> <b>Révisé le :</b> <u>Novembre 2011</u>
Titre : _____		
<b>PROFESSIONNEL(LE) HABILITÉ(E) À EXÉCUTER L'ORDONNANCE ET LE SECTEUR, PROGRAMME OU SERVICE VISÉ :</b> Infirmier (ère) travaillant au CSSSSL, secteur de la salle de réveil		
<b>GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE :</b> Clientèle <b>adulte</b> ayant reçu une anesthésie et présentant de la bradycardie ou une asystolie		
<b>ACTIVITÉS RÉSERVÉES :</b> B- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique Ea- Initier des mesures diagnostiques ou thérapeutiques, selon une ordonnance K- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance		
<b>INDICATIONS ET CONDITIONS D'INITIATION</b> Pour les clients ayant reçu une anesthésie et dont le pouls ralentit à $\leq 45$ battements/min ou une asystolie		
<b>INTENTION THÉRAPEUTIQUE</b> Traiter la bradycardie suite à une anesthésie et éviter les complications associées		
<b>CONTRE-INDICATION</b> Aucune		
<b>LIMITES / RÉFÉRENCE AU MÉDECIN</b> Aucune		
<b>DIRECTIVES</b> <u>En présence de bradycardie <math>\leq 45</math>/min :</u> → Administrer Atropine 0,6 mg IV stat → Aviser l'anesthésiste dans les plus brefs délais		

