

<p>ORDONNANCE COLLECTIVE</p>	<p>INITIER UN GEL LUBRIFIANT OPHTALMIQUE CHEZ LA CLIENTÈLE PRÉSENTANT UNE ALTÉRATION DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE EN SOINS PALLIATIFS DE FIN DE VIE OU SOUS VENTILATION MÉCANIQUE</p>	<p>NO :CC-2-B-EA-4-K</p> <p>Temp : 2.48</p>
<p>Référence à un autre outil :</p> <p><input type="checkbox"/> protocole thérapeutique <input type="checkbox"/> règle de soins infirmiers</p> <p><input type="checkbox"/> protocole de soins infirmiers <input type="checkbox"/> protocole clinique interdisciplinaire</p>		<p>Mise en vigueur le :</p> <p>6 février 2013</p>
<p>PROFESSIONNEL(LE) HABILITÉ(E) À EXÉCUTER L'ORDONNANCE ET LE SECTEUR, PROGRAMME OU SERVICE VISÉ :</p> <p>Infirmières ou infirmiers exerçant auprès de la clientèle en soins palliatifs de fin de vie ou aux soins intensifs</p> <p>Pharmaciens offrant des soins et des services pharmaceutiques à la clientèle visée par l'ordonnance collective</p>		
<p>GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE :</p> <p>Clients en soins palliatifs de fin de vie ou sous ventilation mécanique présentant une altération de l'état de conscience et dont les paupières demeurent entr'ouvertes</p>		
<p>ACTIVITÉS RÉSERVÉES DE L'INFIRMIÈRE:</p> <p>B- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique</p> <p>Ea- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance</p> <p>ACTIVITÉS RÉSERVÉES DU PHARMACIEN:</p> <p>K- Initier la thérapie médicamenteuse selon une ordonnance</p>		
<p>INDICATIONS ET CONDITIONS D'INITIATION</p> <p>Présence :</p> <p>⇒ d'une altération de l'état de conscience (léthargique, stuporeux ou comateux)</p> <p>⇒ Accompagnée :</p> <p>→ d'une exposition de la cornée (paupières entr'ouvertes)</p>		
<p>INTENTION THÉRAPEUTIQUE</p> <p>Soins de confort visant à maintenir l'hydratation de la cornée</p>		
<p>CONTRE-INDICATION</p> <p>Allergie, intolérance ou hypersensibilité au produit</p>		

LIMITES / RÉFÉRENCE AU MÉDECIN

Aucune

DIRECTIVES

Déterminer au PTI, au besoin, la fréquence d'application du gel lubrifiant ophtalmique

Faire l'enseignement de la méthode d'application du gel lubrifiant ophtalmique aux proches aidants et aux intervenants au besoin

Objet de l'ordonnance collective

Gel lubrifiant ophtalmique en application q.4 heures et PRN

RÉFÉRENCES AUX OUTILS CLINIQUES

Méthode de soins : Application de pommade, onguent ou collyre

SOURCES

HILL, J. (2004). EYE CARE FOR THE UNCONSCIOUS, VENTILATED OU MEDICATED PATIENT WITH COMPROMISED LID CLOSURE. THE JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF OPHTHALMIC REGISTERED NURSES. JULY-SEPTEMBER.

GERAGHTY, M. (2005). NURSING THE UNCONSCIOUS PATIENT. NURSING STANDARD. 20, 1, 54-64.

PROCESSUS D'ÉLABORATION**Rédigée par :**

Claudine Tremblay
Conseillère clinicienne en soins infirmiers

Mai 2012
Date

Laurie Turcotte
Infirmière clinicienne

Mai 2012
Date

Personnes consultées :

Dr. Chantal Robitaille
Nom et fonction

Mai 2012
Date

Dr. Caroline Cabana
Nom et fonction

Mai 2012
Date

Dr. Eve-Marie Ouellet
Nom et fonction

Mai 2012
Date

Dr. Philippe Woods
Nom et fonction

Mai 2012
Date

Comité clinique DSI


Présidente du CII

Mai 2012

Date

PROCESSUS D'APPROBATION

Validée par :


Directrice des soins infirmiers

2013/01/21
Date

Validée par :


Directeur des services professionnels et affaires médicales

2013/02/06
Date

Validée par :


Chef du département de la pharmacie *INT.*

2012-12-18
Date

Approuvée par :


Président du CMDP

2013/2/6
Date