



ORDONNANCE PERMANENTE

OBJET

Administration d'un médicament hyperglycémiant ou d'une collation à teneur glucidique chez un usager diabétique présentant des signes et symptômes d'un choc insulinaire (l'hypoglycémie) afin d'augmenter la glycémie.

INDICATION

En présence d'une hypoglycémie chez un usager diabétique traité à l'insuline ou avec des hypoglycémifiants oraux.

APPLICATION

Personnel infirmier oeuvrant dans tous les secteurs du Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière sauf la pouponnière et la pédiatrie.

ORDONNANCE

En présence d'une hypoglycémie symptomatique ou asymptomatique chez l'usager diabétique, en tenant compte de l'état de conscience de l'usager, administrer une collation ou une médication hyperglycémifiante selon l'algorithme d'interventions en annexe de la présente ordonnance permanente.

Protocole d'hypoglycémie chez l'utilisateur diabétique conscient

Étape 1

Si glycémie 3.5 à 3.9 mmol/L
donner **15 g** de glucides.

Ex. : 1 jus de fruits
Si dysphagie : 1 pot de purée de fruits

Si glycémie \leq 3.4 mmol/L
donner **30 g** de glucides.

Ex. : 1 jus de fruits + 3 sachets de sucre
Si dysphagie : 1 pot de purée fruits + 3 sachets de sucre

Étape 2

Attendre 10 minutes et contrôler la glycémie

- 1. Si glycémie $<$ 4 mmol/L, répéter l'étape 1.
Si glycémie \geq 4 mmol/L, passer à l'étape 3.**
- 2. Si l'utilisateur ne répond pas au traitement, aviser le médecin.**

Étape 3

Quand la glycémie est \geq 4 mmol/L :

Repas prévu dans moins de 60 minutes?

Oui \Rightarrow Ne pas donner de collation et attendre le repas.

Non \Rightarrow Donner une collation immédiatement, soit :
6 craquelins avec 1 once de fromage
ou
250 ml (1 tasse) de lait et 2 biscuits secs.

Si dysphagie : donner 1 pouding enrichi

Protocole d'hypoglycémie chez l'usager diabétique inconscient

**Mesurer la glycémie, si glycémie < 3 mmol/L,
débuter protocole et aviser médecin traitant.**

Étape 1

- 1. Donner Dextrose 50 % 50 ml IV direct en 3 minutes si accès veineux.**
- 2. Si pas d'accès veineux possible, donner Instaglucose (intérieur de la joue) puis installer Dextrose 5 % 60 ml/h.**

Étape 2

Attendre 10 minutes et contrôler la glycémie

Si glycémie \leq 4 mmol/L

- 1. Si usager inconscient, donner :
Dextrose 50 % 50 ml, I.V. direct en 3 minutes
ou
Donner Instaglucose (contenu du tube en entier, à l'intérieur de la joue)**
- 2. Si usager conscient, traiter selon protocole de l'usager conscient.**

Étape 3

Attendre 10 minutes et contrôler la glycémie

Si pas d'amélioration de l'état de l'usager, réaviser médecin traitant.