

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>ORDONNANCE COLLECTIVE</b>  | INITIER LE TRAITEMENT À LA MUPIROCINE CHEZ LES USAGERS PORTEURS DE SARM NASAL | <b>NO :</b><br><b>OC-2-B-Ea-K</b><br><br>(temp : 2.05)  |
| <b>Référence à un protocole :</b><br><input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non<br><br>Titre : _____  |   | <b>Mise en vigueur le :</b><br>_____ Janvier 1999<br><br><b>Révisée le :</b><br>_____ Mars 2012 |
| <b>PROFESSIONNEL(LE) HABILITÉ(E) À EXÉCUTER L'ORDONNANCE ET LE SECTEUR, PROGRAMME OU SERVICE VISÉ :</b><br>Infirmiers(ères) travaillant au CSSS du Sud de Lanaudière.   |   |   |
| <b>GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE :</b><br>Usager hospitalisé et/ou suivi en hémodialyse et/ou en attente d'une chirurgie, ayant un résultat positif de SARM (Staphylococcus Aureus Résistant à la Méthicilline) nasal.   |   |   |
| <b>ACTIVITÉS RÉSERVÉES :</b><br>B- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;<br>Ea- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;<br>K- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.                        |   |   |
| <b>INDICATIONS ET CONDITIONS D'INITIATION</b><br>Usager ayant eu un résultat positif au dépistage de SARM nasal   |   |   |
| <b>INTENTION THÉRAPEUTIQUE</b><br>Procéder à la décolonisation nasale par éradication de la bactérie.   |   |   |
| <b>CONTRE-INDICATION</b><br>⇒ Hypersensibilité au mupirocine ou toute autre pommade contenant des polyéthylène-glycols;   |   |   |
| <b>LIMITES / RÉFÉRENCE AU MÉDECIN</b><br>Si résultat positif de SARM aux autres sites de prélèvement (plaies, etc.), référer au médecin pour la détermination du traitement spécifique.   |   |   |
| <b>DIRECTIVES</b><br>⇒ Suite à un résultat de laboratoire SARM nasal positif, appliquer la mupirocine en pommade sur la paroi nasale BID x 5 jours.<br>⇒ Procéder à un dépistage de contrôle 7 jours après la fin du traitement.<br>⇒ Si le dépistage de contrôle est toujours positif, répéter l'application de la mupirocine en |   |   |

pommade sur la paroi nasale BID x 5 jours.

- ⇒ Un suivi des résultats de laboratoires sera effectué par la prévention des infections puisque chez un usager porteur de SARM nasal chronique, c'est-à-dire ayant déjà reçu 2 traitements, le traitement de décolonisation n'est pas appliqué et pourra être cessé le cas échéant.
- ⇒ Pour le résident en hébergement ou suivi en CLSC ayant un résultat positif au dépistage du SARM nasal, contacter, au besoin, le département de la prévention des infections pour discuter de la procédure à suivre, au (450) 654-7525, poste 10111.

#### **RÉFÉRENCES AUX OUTILS CLINIQUES**

Technique de soins infirmiers # 7.16 « Écouvillonnage nasal pour recherche de SARM », CSSSSL

#### **SOURCE**

Institut national de la santé publique du Québec (2006), *Mesures de prévention et de contrôle des infections à SARM au Québec*, INSPQ.

## PROCESSUS D'ÉLABORATION

Rédigée par :

Françoise Sanchez  
Conseillère en prévention des infections

novembre 2011  
Date

Personnes consultées :

Dr Judith Fafard  
Chef du département de microbiologie

Décembre 2011  
Date

Comité de prévention des infections

Décembre 2011  
Date

Comité clinique DSI

22 février 2012  
Date



Comité des infirmiers et infirmières

7 mars 2012  
Date

## PROCESSUS D'APPROBATION

Validée par :

  
chef médical du département de microbiologie

2012-fev-24  
Date

Validée par :

  
Directrice des soins infirmiers

2012-03-23  
Date

Validée par :

  
Chef du département de la pharmacie

20-04-2012  
Date

Validée par :

  
Directeur des services professionnels et des affaires médicales

28/05/2012  
Date

Approuvée par :

  
Président du CMDP

2012/01/25  
Date