

<b>ORDONNANCE COLLECTIVE</b>	INITIER DES ANALYSES DE LABORATOIRE LORS DE SUSPICION D'ÉCLOSION DE GASTRO-ENTÉRITE D'ORIGINE VIRALE	<b>NO : OC-2-B-Ea</b> (Temp : 2,53 )
<b>Référence:</b> <input type="checkbox"/> protocole thérapeutique <input type="checkbox"/> protocole de soins infirmiers Titre : _____	<input type="checkbox"/> règle de soins infirmiers <input type="checkbox"/> protocole clinique interdisciplinaire	<b>Mise en vigueur le :</b> <u>15 mai 2014</u>
<b>PROFESSIONNEL(LE) HABILITÉ(E) À EXÉCUTER L'ORDONNANCE ET LE SECTEUR, PROGRAMME OU SERVICE VISÉ :</b> Infirmières œuvrant au CSSS du Sud de Lanaudière.		
<b>GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE :</b> Usager présentant les symptômes de gastro-entérite.		
<b>ACTIVITÉS RÉSERVÉES :</b> B- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne. Ea- Initier les mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance.		
<b>INDICATIONS ET CONDITIONS D'INITIATION</b> Dans un contexte d'une éclosion suspectée (présence de deux usagers ou plus, présentant des symptômes de gastro-entérite, ayant un lien épidémiologique ex : sur une même unité), tel que défini dans la procédure pour les mesures de prévention et contrôle des cas de gastro-entérite infectieuse d'allure virale.		
<b>INTENTION THÉRAPEUTIQUE</b> Identifier l'agent pathogène entérique responsable de l'éclosion.		
<b>CONTRE-INDICATION</b> Aucune		
<b>LIMITES / RÉFÉRENCE AU MÉDECIN</b> Aucune		

## **DIRECTIVES**

L'infirmière effectue les prélèvements de selles selon l'annexe 7 « types de prélèvement de laboratoire » de la procédure PRO-DPPQ-001, dans les premiers 48h suivant l'apparition des symptômes chez les usagers qui répondent à la définition de la gastro-entérite :

Au moins 2 vomissements en 24 heures

OU

Apparition soudaine de diarrhée au cours d'une période de 24 heures

ET

2 selles de plus que ce qui est considéré normal pour l'usager en 24 heures, en l'absence d'une autre cause apparente (laxatifs, médicaments)

ET

Accompagnés d'au moins un symptôme lié à une infection :

- fièvre
- nausées
- douleurs
- crampes abdominales
- céphalées

Appliquer les précautions de type contact/gouttelettes chez l'usager symptomatique.

S'il survient deux cas ou plus de gastro-entérite sur l'unité, effectuer les prélèvements sur chaque usager symptomatique puis cesser après 5 à 10 prélèvements provenant d'usagers distincts.

## **RÉFÉRENCES AUX OUTILS CLINIQUES (MÉTHODE DE SOINS INFIRMIERS, FORMULAIRES, AUTRES)**

CSSSSL (2013). Procédure pour la prévention et le contrôle de la gastro-entérite

Spécifiquement les annexes suivantes :

- Annexe 2 : Tableau synthèse de la gastro-entérite virale
- Annexe 3 : Grille de surveillance de la diarrhée
- Annexe 7 : Types de prélèvement de laboratoire

## **SOURCES**

INSPQ (Juin 2005), Mesures de contrôle et de prévention des éclosions de cas de gastro-entérite infectieuse d'allure virale (Norovirus) à l'intention des établissements de soins, Avis scientifique, Comité sur les infections nosocomiales du Québec, Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels.

## PROCESSUS D'ÉLABORATION

### Rédigée par :

Linda Bougie et Marie Robert  
Conseillères cadre en prévention des infections

Janvier 2014  
Date

### Personnes consultées :

Julie Lévesque  
Chef de service en prévention des infections

Janvier 2014  
Date

Dr Pierre Jean Maziade  
Microbiologiste

Janvier 2014  
Date

Marilou Dionne  
Conseillère clinicienne en soins infirmiers

Janvier 2014  
Date

Équipe de PCI

Janvier 2014  
Date

Comité clinique de la DPPQ

Mars 2014  
Date



Présidente CII


Janvier 2014  
Date

## PROCESSUS D'APPROBATION

### Validée par :

  
Chef médical du département de microbiologie

2014-04-03  
Date


  
Directrice des soins infirmiers

2014-04-11  
Date

  
Directeur des services professionnels et des affaires médicales

2014/05/15  
Date

### Approuvée par :

  
Président du CMDP

2014/5/7

Date