



## ORDONNANCE PERMANENTE

### OBJET

Application d'un anesthésique topique AMETOP (Tétracaïne).

### INDICATION

Analgesie topique de la peau intacte en vue de l'insertion d'une aiguille chez les enfants de plus de 1 an hospitalisés à l'unité de pédiatrie.

### CONTRE- INDICATION

Hypersensibilité aux anesthésiques locaux de type ESTER.

### APPLICATION

Infirmiers (ères) travaillant à l'unité de pédiatrie du C.H. Le Gardeur.

### ORDONNANCE

Appliquer AMETOP gel sur une peau intacte et sous pansement occlusif 30-45 minutes avant l'insertion d'une aiguille.

PROPOSÉ :

\_\_\_\_\_  
Chef du département de pédiatrie,  
Dr Elise Martin

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Direction des soins infirmiers

\_\_\_\_\_  
Date

ADOPTÉ :

\_\_\_\_\_  
Exécutif du CMDP

\_\_\_\_\_  
Date

APPROUVÉ :

\_\_\_\_\_  
Conseil d'administration

\_\_\_\_\_  
Date

En vigueur le :

\_\_\_\_\_

2016-06-15

E:\Pratique clinique\Pratique clinique\_Ordonnances collectives\Mère-enfant, famille, jeunesse 1ère et 2ème ligne (0-17 ans)\SUD et CISSSL\SUD OC  
3.19\_Application\_d'un\_anesthésique\_topique\_AMETOP\_Tétracaïne.doc