

## ORDONNANCE PERMANENTE

### OBJET

Administrer un médicament à un usager devant subir un examen radiologique : lavement baryté ou pyélographie.

### APPLICATION

Infirmiers (ères) travaillant au C.H. Pierre-Le Gardeur excluant la pédiatrie.

### INDICATION

Pour les usagers devant subir un lavement baryté ou pyélographie I.V.

### CONTRE- INDICATION

Allergie à l'un ou l'autre des médicaments nécessaires :

- bisacodyl (Dulcolax ®), citrate de magnésium (Citromag®), hydroxyde de magnésium, cascara.

-

### ORDONNANCE

#### Option 1:

La veille de l'examen :

- À 18h00 : citrate de magnésium (Citromag ®) 300 mL p.o.
- À 20h00 : bisacodyl (Dulcolax ®) 5 mg 3 co p.o. (total : 15 mg)

Le matin de l'examen :

- 1 h avant examen : bisacodyl (Dulcolax ®) 10 mg/supp 1supp. I.R.  
Retenir 10 à 20 minutes

Après l'examen : Si lavement baryté :

- Magnésie – Cascara 30 mL p.o.

Option 2: Si contre-indication à option 1 soit : insuffisance cardiaque, insuffisance rénale ou créatinine sérique  $\geq 200$  umol/L

#### *Aviser la pharmacie*

La veille de l'examen :

- À partir de 15h00 : boire 240 mL de Golytely ® aux 10 min ad 4000 mL
- À 20h00 : bisacodyl (Dulcolax ®) 5 mg 2 co p.o.

Après l'examen si lavement baryté :

- Magnésie – Cascara 30 mL p.o.