

ORDONNANCE PERMANENTE

OBJET

Traitement d'un usager hémodialysé présentant une douleur rétro-sternale (DRS).

INDICATION

Pour tous les usagers présentant une douleur thoracique région rétro-sternale, toujours suspecter une douleur coronarienne.

CONTRE-INDICATION

Hypotension : traiter l'hypotension artérielle de l'usager selon l'ordonnance permanente

hypotension pendant un traitement d'hémodialyse

Signes de surcharge (dyspnée, oedème périphérique...) voir ordonnance permanente : Appliquer les interventions propres à la prévention de décompensation pulmonaire chez la clientèle dialysée.

APPLICATION

Tous les infirmiers et infirmières oeuvrant au service de suppléance rénale.

ORDONNANCE

1. Si DRS présente à l'arrivée :

- a) Aviser le néphrologue avant de débuter le traitement
- b) Contrôler T.A.
- c) O₂ par Ventimask à 28%
- d) Administrer Nitrolingual 0.4 mg une vaporisation S.L. aux 5 minutes ad 3 doses maximum
- e) Si douleur persiste après 3 doses de nitroglycérine, faire ECG, faire CK, CK-MB, troponine et réavisier le néphrologue

1. Si DRS per dialyse

- a) Installer moniteur cardiaque et imprimer une bande du tracé du rythme cardiaque
- b) O₂ par Ventimask à 28%
- c) Fermer l'ultrafiltration (UF)
- d) Réduire le débit de la pompe à 150 mL/min. jusqu'à résolution de la DRS
- e) Vérifier la T.A., le pouls et en noter la régularité avant d'administrer la nitroglycérine
- f) Administrer Nitrolingual 0.4 mg une vaporisation S.L. aux 5 minutes ad 3 doses maximum
- g) Si douleur persiste après 3 doses de nitroglycérine, faire ECG, faire CK, CK-MB, troponine
- h) Aviser le néphrologue