

<b>ORDONNANCE COLLECTIVE</b>	INTERVENIR EN PRÉSENCE D'UNE ROUGEUR OU D'UN ÉCOULEMENT AU NIVEAU DU SITE DE SORTIE DU CATHÉTER VEINEUX CENTRAL DESTINÉ AUX TRAITEMENTS D'HÉMODIALYSE.	<b>NO : OC-2-B-Ea-K</b>  (Temp : 8.32)
<b>Référence:</b> <input type="checkbox"/> protocole thérapeutique <input type="checkbox"/> règle de soins infirmiers <input type="checkbox"/> protocole de soins infirmiers <input type="checkbox"/> protocole clinique interdisciplinaire Titre : _____		<b>Mise en vigueur le :</b> <u>  décembre 2010  </u>  <b>Révision le :</b> _____
<b>PROFESSIONNEL(LE) HABILITÉ(E) À EXÉCUTER L'ORDONNANCE ET LE SECTEUR, PROGRAMME OU SERVICE VISÉ :</b> Tous les infirmiers et infirmières œuvrant au service de suppléance rénale.		
<b>GRUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE :</b> Tous les clients hémodialysés porteur d'un cathéter veineux central.		
<b>ACTIVITÉS RÉSERVÉES :</b> B- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique; Ea- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutique, selon une ordonnance; K- Administrer et ajuster de médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.		
<b>INDICATIONS ET CONDITIONS D'INITIATION</b> Client hémodialysé porteur d'un cathéter veineux central présentant <u>au niveau du site de sortie</u> du cathéter: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une rougeur OU</li> <li>▪ Un exsudat</li> </ul>		
<b>INTENTION THÉRAPEUTIQUE:</b> Traiter localement l'infection au niveau du site de sortie du cathéter.		
<b>CONTRE-INDICATION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allergie à la gramicidine</li> <li>▪ Allergie au polymyxine B</li> </ul>		

## LIMITES / RÉFÉRENCE AU MÉDECIN

Présence de signes d'infection a/n du tunnel sous cutané : aviser le néphrologue.

## DIRECTIVES

En présence d'une rougeur a/n du site de sortie du cathéter:

- Appliquer localement une crème antibiotique à base de Gramicidine/Polymyxine B (exemple: Polytopic, Polysporin) x 6 traitements, puis réévaluer.
- Aviser le néphrologue si rougeur non résolue.

En présence d'un écoulement a/n site de sortie du cathéter:

- Effectuer une culture du site de sortie du cathéter.
- Appliquer localement une crème antibiotique à base de Gramicidine/Polymyxine (exemple: Polytopic, Polysporin) x 6 traitements, puis réévaluer.
- Aviser le néphrologue si écoulement non résolu.

Si accompagné de température > 37,8°C (buccal), se référer à l'ordonnance collective # 8.24

**\*\*Aviser le néphrologue si augmentation des signes d'infection \*\***

## RÉFÉRENCES AUX OUTILS CLINIQUES (MÉTHODE DE SOINS INFIRMIERS, FORMULAIRES, AUTRES)

Ordonnance collective #8.24: Intervenir chez un client hémodialysé présentant de la fièvre et/ou des frissons.

## SOURCES

Consensus de l'équipe médicale.

## PROCESSUS D'ÉLABORATION

### Rédigée par :

Caroline Fagnant  
Infirmière clinicienne Suppléance rénale

Mars 2010  
Date

### Personnes consultées :

Dr Pierre Landry  
Néphrologue, Chef médical suppléance rénale

Mars 2010  
Date

Dr Jean Proulx  
Néphrologue

Mars 2010  
Date

**Personnes consultées (suite):**

Kathleen Garneau  
Infirmière conseillère à la prévention des infections

Mars 2010  
Date

Valérie Levert  
Pharmacienne

Mars 2010  
Date

**PROCESSUS D'APPROBATION**

**Approuvée par :**

Audrey Bouchard  
Directrice des soins infirmiers

2010/12/13  
Date

Lucie Michet  
Chef du département de la pharmacie

6-12-10  
Date

Yannick Nadeau  
Directeur des affaires médicales et du développement des projets organisationnels

2010/12/03  
Date

Président du CMDP

2010/11/18  
Date