

OBJET

Traitement d'une condition nécessitant un analgésique mineur ou un antipyrétique.

INDICATION

Patient de 15 ans et plus présentant :

- Céphalée
- ou Douleur bénigne
- ou Température ($T^{\circ}_B \geq 38.5^{\circ} C$ ou $T^{\circ}_R > 38^{\circ} C$)

**CONTRE-
INDICATION**

Allergie à l'acétaminophène
Insuffisance hépatique aiguë et/ou sévère
Patient opéré en chirurgie générale
Intoxication à l'acétaminophène
Patient recevant déjà dose maximale d'acétaminophène (4g/jour)
Si prise d'acétaminophène dans les derniers 3h, demander l'avis du médecin.

APPLICATION

Infirmier(ère) travaillant dans tous les secteurs du Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière, Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, sauf pédiatrie, dialyse.
Infirmier(ère) travaillant en CHSLD.

ORDONNANCE

- 1° Acétaminophène (Tylénol®, Atasol®, etc) 500 mg/co, 1-2 comprimés per os q 4-6 heures PRN. Si per os impossible, acétaminophène 650 mg/suppositoire 1 suppositoire I.R. q 4-6 heures PRN. (max 4g acétaminophène/24h, incluant la médication régulière sous forme simple ou composée).
- 2° Aviser le médecin dans les 24 heures en CH.