

ORDONNANCE COLLECTIVE

ORDONNANCE : Instiller Lidocaïne 2% (Xylocaine) en gelée avant l'insertion d'un cathéter vésical chez l'homme.		NUMÉRO : 1.01
		DATE : Novembre 2003
		RÉVISÉE : Mars 2008
PROFESSIONNELS VISÉS	Infirmières	Référence à un protocole
TYPE D'ORDONNANCE	Ordonnance visant à initier des mesures thérapeutiques.	Non

PROFESSIONNELS HABILITÉS

- Infirmières
- Les infirmières auxiliaires sont autorisées à contribuer à l'application de cette ordonnance après évaluation par l'infirmière.

CLIENTÈLES VISÉES

- Les usagers masculins de plus de 14 ans

UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS

- CSSSNL

ACTIVITÉS RÉSERVÉES

INFIRMIÈRES

- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES

- Administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE

- Anesthésie de surface et lubrification de l'urètre chez l'homme avant l'insertion d'un cathéter vésical.

2. CONDITION D'INITIATION

- Ordonnance médicale individuelle ou collective pour l'installation d'un cathéter vésical ou d'un cathétérisme.

3. ORDONNANCE

- Instiller **Lidocaïne 2%** (Xylocaïne) en gelée dans l'urètre avant l'insertion d'un cathéter vésical chez l'homme.

4. CONDITIONS D'APPLICATION

4.1. Indications

- Diminuer l'inconfort ou la douleur lors de l'insertion d'un cathéter vésical selon le jugement du professionnel.

4.2. Contre-indications

- Hypersensibilité connue aux anesthésiques locaux ou aux autres composants de la préparation.

5. MÉTHODES

5.1. Précautions et directives

- Ne pas utiliser plus d'une seringue de 10 ml préremplie.
- Ne pas administrer plus de 4 doses/24 heures.

5.2. Procédures

- Un volume de 5 à 10 ml est habituellement nécessaire (technique stérile).
- Attendre quelques minutes avant d'insérer le cathéter vésical.
- L'anesthésie se produit en moins de 5 minutes et dure environ 20 à 30 minutes.
- Méthodes de soins infirmiers informatisées de l'AQESSS:
«Installation d'un cathéter vésical à demeure chez l'homme»
«Cathétérisme vésical chez l'homme»

5.3. Éléments de surveillance

- N.A.

5.4. Complications

- N.A.

5.5. Limites d'application

- N.A.

6. SOURCES

- «*Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques*», (2007).

ORDONNANCE COLLECTIVE

ORDONNANCE : Instiller Lidocaïne 2% (Xylocaïne) en gelée avant l'insertion d'un cathéter vésical chez l'homme.	NUMÉRO : 1.01
	DATE : Novembre 2003
	RÉVISÉE : Mars 2008

Chef du service d'urologie : Jean Crevier
Date : 08/06/16 Dr Jean Crevier

Chef du département de chirurgie : Michel Dunberry
Date : 2008/6/19 Dr Michel Dunberry

Chef du département de pharmacie : Claude Gravel
Date : 2008/06/23 Claude Gravel, infirmier

Directeur des soins infirmiers : Donald Hainault
Date : 21 juillet 2008 Donald Hainault

Adoptée par le CMDP : Jean-Jacques Klopfenstein
Date : 2008-09-10 Jean-Jacques Klopfenstein, M.D., président