

OBJET

Directives préopératoires pour exérèse de cataracte.

INDICATION

Pour tous les usagers devant subir une chirurgie pour exérèse de cataractes.

APPLICATION

Infirmières de la clinique de préadmission et de l'unité de la chirurgie d'un jour.

ORDONNANCE

À LA CLINIQUE DE PRÉADMISSION :

1. LES USAGERS RECEVANT DES ANTI-PLAQUETTAIRES tout produit qui contient de l'acide acétylsalicylique (Aspirine) tel que : Entrophen, Novasen, Asaphen, Rivasa, M.S.D.-A.A.S., pms-A.S.A., Apo A.S.A., A.S.A., Aggrenox, et autres produits tels que : clopidogrel (Plavix), ticlopidine (Ticlid), dipyridamole (Persantine), etc.

- En l'absence d'une ordonnance spécifique, le traitement anti-plaquettaire se poursuit en préopératoire.

2. LES USAGERS ANTICOAGULÉS : warfarine (Coumadin), acénocoumarol (Sintrom)

- En l'absence de prescription médicale du chirurgien, le traitement anticoagulant se poursuit en préopératoire.
- Si le traitement doit être cessé, le chirurgien demande une évaluation par le service de médecine interne. Suite à cette consultation :
 - a) un avis de date de cessation du traitement anticoagulant est émis en préopératoire.
 - b) si l'usager doit absolument être anticoagulé, ce dernier sera mis sous héparine.

3. SI ANESTHÉSIE LOCALE PRÉVUE :

- L'infirmière avise l'usager de prendre sa médication usuelle le matin de la chirurgie dès son réveil.
 - E.C.G. préopératoire si présence au questionnaire de douleurs rétro-sternales ou de douleurs épigastriques.

ET/OU
 - E.C.G. préopératoire si demandé par l'ophtalmologiste ou par le médecin qui a fait l'histoire de cas médicale en préopératoire.
- L'usager peut prendre un déjeuner léger 2 heures avant son arrivée au centre hospitalier (rôties, céréales ou muffin et café, lait ou jus).

4. SI ANESTHÉSIE GÉNÉRALE PRÉVUE :

