


# LANAUDIÈRE

## SOUS ENQUÊTE



### CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES

#### Insécurité alimentaire

Proportion de la population vivant dans un ménage en situation alimentaire précaire

#### Situation financière

Proportion de la population se disant insatisfaite ou très insatisfaite de sa situation financière

#### Scolarité

Proportion de la population sans diplôme d'études secondaires

### ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

#### Exposition à la fumée de tabac dans l'environnement

Proportion de non-fumeurs exposés à la fumée secondaire dans les lieux publics

Proportion de non-fumeurs exposés à la fumée secondaire à la maison

### ENVIRONNEMENT SOCIAL

#### Sentiment d'appartenance à la communauté

Proportion de la population ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale

#### Soutien social

Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social

### HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

#### Activité physique (pratique)

Proportion de la population selon le niveau d'activité physique de loisirs - très actifs

Proportion de la population selon le niveau d'activité physique de loisirs - actifs ou très actifs

Proportion de la population selon le niveau d'activité physique de loisirs - actifs et très actifs

Proportion de la population selon le niveau d'activité physique de loisirs - moins actifs

Proportion de la population selon le niveau d'activité physique de loisirs - sédentaires

Proportion de la population selon le niveau d'activité physique de loisirs - sédentaires

Proportion de la population ne pratiquant jamais la marche comme moyen de transport actif

Proportion de la population ne pratiquant jamais la bicyclette comme moyen de transport actif

#### Consommation d'alcool

Proportion de buveurs actuels

Proportion de buveurs actuels

Proportion de buveurs actuels

Proportion de la population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine

Proportion de la population présentant une consommation élevée d'alcool au moins une fois par mois au cours d'une année

#### Habitudes alimentaires

Proportion de la population consommant moins de cinq fois par jour des fruits et des légumes

#### Tabagisme

Proportion de fumeurs (réguliers ou occasionnels)

Proportion de fumeurs (réguliers ou occasionnels)

Proportion de fumeurs (réguliers ou occasionnels)

#### Vaccination contre l'influenza

Proportion de la population ayant reçu le vaccin contre la grippe saisonnière au cours d'une période de douze mois

### ORGANISATION DES SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ

#### Services préventifs

Proportion de femmes ayant passé une mammographie au cours d'une période de moins de deux ans

Proportion de femmes ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans

Proportion d'hommes ayant déjà passé un test d'antigène prostatique spécifique (AP5)

#### Consultation d'un dentiste

Proportion de la population ayant consulté un dentiste ou un orthodontiste

#### Consultation de professionnels de la santé

Proportion de la population ayant consulté au moins un professionnel de la santé

Proportion de la population ayant consulté un médecin de famille, un pédiatre ou un omnipraticien

Proportion de la population ayant consulté un spécialiste de la vue

Proportion de la population ayant consulté un autre médecin spécialiste (chirurgien, allergologue, orthopédiste,...)

Proportion de la population ayant consulté un chiropraticien

Proportion de la population ayant consulté un physiothérapeute

Proportion de la population ayant consulté un psychologue

### ÉTAT DE SANTÉ GLOBALE

#### État de santé général

Proportion de la population ayant des problèmes de santé fonctionnelle

#### Prévalence des principaux problèmes de santé chronique

Allergies alimentaires

Allergies non alimentaires

Arthrite/ Rhumatisme sauf la fibromyalgie

Asthme

Bronchite chronique

Cancer

Diabète

Emphysème ou bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Hypertension

Maladies cardiaques

Maux de dos autres que fibromyalgie et arthrite

Migraines

Problèmes de la thyroïde

Troubles d'anxiété

Troubles d'apprentissage

Troubles de l'humeur

#### Incapacité

Proportion de la population ayant une limitation d'activités

Proportion de la population ayant souffert d'incapacité au cours d'une période de deux semaines

Proportion de la population ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne

#### Perception de l'état de santé

Proportion de la population se percevant en excellente ou très bonne santé

Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé

### ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE

#### Surplus de poids

Proportion de la population présentant un surplus de poids (embonpoint et obésité)

#### Insuffisance de poids

Proportion de la population présentant une insuffisance de poids

#### Blessures

Proportion de la population ayant eu une blessure causée par des mouvements répétitifs

Proportion de la population victime de blessures

#### Infections transmissibles sexuellement

Proportion de la population ayant été diagnostiquée pour une infection transmise sexuellement

### ÉTAT DE SANTÉ PSYCHOSOCIALE/MENTALE

#### État de santé mentale

Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé mentale

Proportion de la population se percevant en excellente ou très bonne santé mentale

Proportion de la population ayant un niveau élevé de détresse psychologique (K10)

Proportion de la population ayant un niveau élevé de détresse psychologique (K6)

#### Satisfaction dans la vie

Proportion de la population se disant insatisfaite de sa vie en général

#### Stress (perception)

Proportion de la population éprouvant un stress quotidien élevé

#### Stress au travail

Proportion de la population éprouvant un stress quotidien élevé au travail

Proportion de travailleurs ayant une faible latitude de décision relative aux compétences requises au travail

Proportion de travailleurs n'ayant pas une grande latitude de prise de décision au travail

Proportion de travailleurs ayant un niveau élevé de demandes psychologiques en milieu de travail

Proportion de travailleurs ayant un niveau élevé d'effort physique relié au travail

Proportion de travailleurs ayant un niveau élevé d'insécurité d'emploi

Proportion de travailleurs ayant un faible soutien social au travail

#### Suicide

Proportion de la population ayant songé au suicide au cours de sa vie

Proportion de la population présentant des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de douze mois

### POPULATION CIBLÉE

### 2000-2001

### 2003

### 2005

### 2007-2008

12 ans et plus

nd

nd

4,6

nd

12 ans et plus

nd

nd

12,2

11,1 <sup>4</sup>

25 ans et plus

nd

nd

23,4

23,0 <sup>4</sup>

### POPULATION CIBLÉE

12 ans et plus

74,3 <sup>2,3</sup>

29,1 <sup>1,3</sup>

23,5 <sup>1,2</sup>

9,5 <sup>4</sup>

12 ans et plus

52,8 <sup>2,3</sup>

20,9 <sup>1</sup>

19,3 <sup>1</sup>

11,9 <sup>4</sup>

### POPULATION CIBLÉE

12 ans et plus

22,7 <sup>2,3</sup>

12,6 <sup>1,2</sup>

15,5 <sup>1,3</sup>

13,6 <sup>4</sup>

12 ans et plus

13,9

nd

13,8

nd

### POPULATION CIBLÉE

12 à 17 ans

nd

nd

46,2

nd

18 ans et plus

nd

nd

33,2

nd

20 ans et plus

29,3 <sup>3</sup>

34,5 <sup>4</sup>

32,3 <sup>1</sup>

nd

12 à 17 ans

nd

nd

32,9

nd

18 ans et plus

nd

nd

28,1

nd

20 ans et plus

32,9 <sup>3</sup>

27,9

29,2 <sup>1</sup>

nd

12 ans et plus

51,2 <sup>3</sup>

40,4 <sup>3</sup>

38,3 <sup>1,2</sup>

nd

12 ans et plus

91,8 <sup>3</sup>

91,2 <sup>3</sup>

91,1 <sup>1,2</sup>

nd

12 ans et plus

81,0 <sup>2</sup>

84,9 <sup>1</sup>

82,5

82,7 <sup>4</sup>

12 à 17 ans

nd

nd

53,1

51,9 <sup>4</sup>

18 ans et plus

nd

nd

85,8

86,4 <sup>4</sup>

12 ans et plus

5,0

7,0

7,2

nd

12 ans et plus

11,7 <sup>2,3</sup>

17,1 <sup>1</sup>

15,8 <sup>1</sup>

22,2 <sup>4</sup>

#### Habitudes alimentaires

Proportion de la population consommant moins de cinq fois par jour des fruits et des légumes

12 ans et plus

62,1 <sup>2</sup>

56,2 <sup>1</sup>

nd

50,0 <sup>4</sup>

#### Tabagisme

Proportion de fumeurs (réguliers ou occasionnels)

Proportion de fumeurs (réguliers ou occasionnels)

Proportion de fumeurs (réguliers ou occasionnels)

12 ans et plus

33,3 <sup>2,3</sup>

28,5 <sup>1,3</sup>

28,3 <sup>1,2</sup>

28,8 <sup>4</sup>

12 à 17 ans

nd

nd

17,8

13,8 <sup>4</sup>

18 ans et plus

nd

nd

29,5

30,6 <sup>4</sup>

#### Vaccination contre l'influenza

Proportion de la population ayant reçu le vaccin contre la grippe saisonnière au cours d'une période de douze mois

50 ans et plus

35,0

37,9

39,3

43,7 <sup>4</sup>

### ORGANISATION DES SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ

### POPULATION CIBLÉE

#### Services préventifs

Proportion de femmes ayant passé une mammographie au cours d'une période de moins de deux ans

Proportion de femmes ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans

Proportion d'hommes ayant déjà passé un test d'antigène prostatique spécifique (AP5)

35 ans et plus

43,6

42,4

43,8

nd

20 à 69 ans

72,1

74,3

72,2

nd