

Sensibilité des pathogènes GRAM NÉGATIF au CHRDL*

2011-2012

Antibiotique	<i>E.Coli</i> (n=959)	<i>P.mirabilis</i> (n=72)	<i>Klebsiella sp</i> (n=245)	<i>Enterobaceter sp</i> (n=57)	<i>Citrobacter sp</i> (n=30)	<i>Serratia sp</i> (n=27)	<i>Proteus /Morgan. / Provid. sp</i> (n=40)	<i>P. aeruginosa</i> (n=113)	<i>S.maltophilia</i> (n=21)
AMPICILLINE	64%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PIPERACILLINE									94%
CEFAZOLINE	64%	75%	10%	0%	0%	0%	0%		
CEFOTAXIME	97%	93%	100%	86%	100%	100%	98%	0%	
CEFTAZIDIME									95%
ERTAPENEM	100%	100%	100%	89%	100%	100%	100%		
IMIPENEM	100%		100%	95%	97%	93%			88%
GENTAMICINE	96%	96%	99%	100%	97%	100%	95%	90%	
TOBRAMYCINE									96%
TRIMETHO+SULFA.	82%	89%	96%	98%	93%	100%	85%		90%
CIPROFLOXACINE	89%	97%	99%	95%	97%	100%	98%	91%	
FURANES	96%	0%	40%	28%	83%	0%	0%		

Pathogènes isolés d'échantillons de tout site prélevés chez des patients au CHRDL* (1 souche/pt/an)

* CHRDL = Unités de l'aile A, USI, Urgence, Hémodialyse, SOP/CDJ et Endoscopie

Maryse Cayouette, MD, FRCP(C)

Microbiologiste-infectiologue

Sensibilité des pathogènes GRAM POSITIF au CHRDL* 2011-2012

Antibiotique	<i>S.aureus</i> (n=258)	Staph. Coag- (n=139)	Strepto. Gr. A (n=159)	Strepto. Gr. B (n=40)	Pneumocoque (n=93)	Entérocoque (n=283)
PENICILLINE G	26%	22%			84%	
CMI PENI < 4 mg/L					100%	
AMPICILLINE						86%
OXACILLINE	92%	62%				
ERYTHROMYCINE	73%	48%	86%	70%	80%	
CLINDAMYCINE	76%	60%	84%	73%		
FURANES	99%	99%				84%
TRIMETHO+SULFA.	100%	71%			95%	
VANCOMYCINE	100%	100%				100%
LINEZOLIDE	100%	100%				
MUPIROCINE	96%	71%				
MOXIFLOXACINE					98%	
CIPROFLOXACINE						40%

Pathogènes isolés d'échantillons de tout site, excluant les dépistages SARM/ERV* (1 souche/pt/an)

* Externe/hébergement = Unités ailes BCD du CHRDL et prélèvements hors CHRDL

Maryse Cayouette, MD, FRCP(C)

Microbiologiste-infectiologue

Sensibilité des pathogènes GRAM NÉGATIF en externe/hébergement* 2011-2012

Antibiotique	<i>E.Coli</i> (n=1631)	<i>P.mirabilis</i> (n=103)	<i>Klebsiella sp</i> (n=256)	<i>Enterobaceter sp</i> (n=59)	<i>Citrobacter sp</i> (n=39)	<i>Serratia sp</i> (n=22)	<i>Proteus /Morgan. / Provid. sp</i> (n=27)	<i>P. aeruginosa</i> (n=110)	<i>S.maltophilia</i> (n=22).
AMPICILLINE	67%	90%	0%	0%	0%	0%	0%		
PIPERACILLINE								99%	
CEFAZOLINE	67%	82%	5%	0%	5%	0%	0%		
CEFOTAXIME	97%	98%	100%	90%	90%	100%	100%		
CEFTAZIDIME								98%	
ERTAPENEM	100%	100%	100%	95%	97%	100%	100%		
IMIPENEM	100%		100%	100%	100%	95%		93%	
GENTAMICINE	95%	94%	100%	98%	97%	100%	96%	95%	
TOBRAMYCINE								96%	
TRIMETHO+SULFA.	83%	94%	95%	95%	90%	95%	89%		73%
CIPROFLOXACINE	88%	100%	99%	98%	95%	91%	100%	95%	
FURANES	96%	0%	32%	40%	86%	5%	0%		

Pathogènes isolés d'échantillons de tout site prélevés en externe/hébergement* (1 souche/pt/an)

* Externe/hébergement = Unités ailes BCD du CHRDL et prélèvements hors CHRDL

Maryse Cayouette, MD, FRCP(C)

Microbiologiste-infectiologue

Sensibilité des pathogènes GRAM POSITIF en externe/hébergement* 2011-2012

Antibiotique	<i>S.aureus</i> (n=215)	Staph. Coag- (n=42)	Strepto. Gr. A (n=347)	Strepto. Gr. B (n=216)	Pneumocoque (n=33)	Entérocoque (n=305)
PENICILLINE G	30%	36%			73%	
CMI PENI < 4 mg/L					100%	
AMPICILLINE						97%
OXACILLINE	88%	76%				
ERYTHROMYCINE	67%	60%	94%	73%	64%	
CLINDAMYCINE	73%	71%	93%	75%		
FURANES	100%	98%				97%
TRIMETHO+SULFA.	100%	74%			94%	
VANCOMYCINE	100%	100%				100%
LINEZOLIDE	100%	100%				
MUPIROCINE	93%	71%				
MOXIFLOXACINE					100%	
CIPROFLOXACINE						47%

Pathogènes isolés d'échantillons de tout site, excluant les dépistages SARM/ERV* (1 souche/pt/an)

* Externe/hébergement = Unités ailes BCD du CHRDL et prélèvements hors CHRDL

Maryse Cayouette, MD, FRCP(C)

Microbiologiste-infectiologue