

Répertoire des analyses : Banque de sang

S'assurer d'avoir un spécimen d'apparence normale et une requête adéquatement identifiés. Ils doivent être identifiés en respectant la politique de double identification appliqué au **Centre Hospitalier de Lanaudière du CISSS de Lanaudière**. Il ne doit subsister aucun doute sur l'identité du receveur. L'identification du spécimen doit se faire au chevet et en présence de l'utilisateur.

- Informatiser le spécimen à l'aide du SIL en utilisant le code d'analyse BANQS pour tout spécimen
- Effectuer un « scan prélèvement »
- Compléter la requête AH-238 (papier)
 - Double identification de l'utilisateur (idéalement plaquer la carte d'hôpital ou de RAMQ)
 - Indiquer l'unité de soins
 - Indiquer le nom du médecin prescripteur
 - Cocher les analyses demandées
 - Indiquer le type et le nombre de produit requis
 - Indiquer la priorité
 - Indiquer la date prévue de la transfusion
 - Signature du préleveur
 - Date et heure du prélèvement
- Le préleveur doit s'assurer de la concordance des renseignements inscrits sur le prélèvement et la requête avant de l'acheminer au laboratoire
- Toute discordance entre la requête et le spécimen nécessite un nouveau prélèvement et une nouvelle requête
- Sous AUCUN prétexte, la ré-identification d'un spécimen et/ou requête n'est permise
- En aucun temps, le spécimen ou la requête ne sera retourné à l'unité de soins

Répertoire alphabétique des analyses effectuées localement (au CHDL)

Nom du test	Code SIL Alpha	Code SIL Numérique	Contenant	Tube	Jeûne	Délai de conservation pour échantillon NON STABILISÉ	Température de transport pour échantillon NON STABILISÉ	Service
CODE 50	BANQS		1RO	ROSE	N	4 h	18 °C à 25 °C	BDS
COMPATIBILITÉ	BANQS		1RO	ROSE	N	4 h	18 °C à 25 °C	BDS
COOMBS DIRECT	BANQS		1RO	ROSE	N	4 h	18 °C à 25 °C	BDS
COOMBS INDIRECT	BANQS		1RO	ROSE	N	4 h	18 °C à 25 °C	BDS
CULOT GLOBULAIRE	BANQS		1RO	ROSE	N	4 h	18 °C à 25 °C	BDS
GROUPE SANGUIN	BANQS		1RO	ROSE	N	4 h	18 °C à 25 °C	BDS
RECHERCHE D'ANTICORPS IRRÉGULIERS	BANQS		1RO	ROSE	N	4 h	18 °C à 25 °C	BDS
TITRAGE D'ANTICORPS	BANQS		1RO	ROSE	N	4 h	18 °C à 25 °C	BDS

Note: Ceci est un document contrôlé et toute copie de ce document doit avoir été vérifiée, paraphée et datée avant son utilisation afin de certifier de sa concordance avec le document courant sur le site intranet et/ou web du CISSSLanaudière Nord

Mise à jour : 2017-12-07

Demande d'analyse de routine en banque de sang :

⇒ AUCUN produit mis en réserve

- Groupe sanguin (ABO-Rh)
- Coombs indirect (Recherche d'anticorps irréguliers)

Demande de CODE 50 :

⇒ AUCUN produit mis en réserve

⇒ AUCUN produit mis en réserve

- Groupe sanguin (ABO-Rh)
- Coombs indirect (Recherche d'anticorps irréguliers)

Demande de sang :

Plusieurs synonymes sont utilisés pour une demande de sang tel que : *groupé croisé, Cross-match, transfusion sanguine, compatibilité*

- Groupe sanguin (ABO-Rh)
- Coombs indirect (Recherche d'anticorps irréguliers)
- Compatibilité (avec le produit à transfuser)
- Croisement entre le culot à transfuser et le plasma du receveur

Remarque : Le produit sanguin (culot globulaire) est mis en réserve pour une période maximale de 96 heures au nom de l'utilisateur

Demande de sang selon le protocole en urgence (sans-compatibilité)

Se référer à la procédure : **Émission de culot - Extrême urgence BDS-PON-034**

IMPORTANT :

A la distribution, le commentaire suivant s'inscrira sur le bordereau : TRANSFUSION SANS COMPATIBILITÉ AUTORISÉ PAR :
Le nom du médecin qui autorise le sang sans compatibilité doit apparaître sur le bordereau d'émission

Demande de sang SANS prélèvement sanguin reçu au labo et lors de CODE ORANGE:

- Distribuer immédiatement le nombre de culot **O** demandés par le médecin :
 - **O NÉGATIF** : Femmes en âge de procréer et les enfants de sexe féminins
 - **O POSITIF** : Hommes et garçons

Demande de deuxième détermination du groupe sanguin :

⇒ Demande faite par le laboratoire de Banque de sang à l'unité de soins

Pour répondre aux exigences en hémovigilance, un deuxième prélèvement (**un tube ROSE**) est demandé par le laboratoire de banque de sang pour confirmer le groupe sanguin du receveur lorsque le résultat n'est pas connu du système Trace Line ou qu'il est inconnu de la base de données provinciale. Il est requis lors de demande de produits sanguins labiles (culots, plasmas, plaquettes) et/ou WinRhO. Cette procédure est établie pour l'élimination des erreurs de prélèvements qui peuvent conduire à une incompatibilité ABO et/ou s'assurer du Rh avant l'administration d'un Anti-D.