

ORDONNANCE COLLECTIVE

INITIER UN TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE EN PRÉSENCE DE SIGNES ET SYMPTÔMES SUGGESTIFS D'UNE CONJONCTIVITE BACTÉRIENNE

Territoire : CISSS de Lanaudière

Période de validité : 3 ans

GÉNÉRAL

Référence à un protocole : Oui Non

Date d'entrée en vigueur : 25 janvier 2024

Date de la dernière révision (si applicable) : N/A

Date prévue de la prochaine révision : Janvier 2026

Date d'échéance : Janvier 2027

Pour toute question sur l'application de cette ordonnance collective, veuillez-vous adresser au médecin répondant, Dr Samuel Boudreault-Larochelle par courriel : samuel.boudreault.med@ssss.gouv.qc.ca spécifiant « Question OC Conjonctivite » dans l'objet.

PROFESSIONNELS AUTORISÉS

Professionnel(s) habilité(s) à exécuter l'ordonnance :

- Pharmaciens communautaires de Lanaudière offrant des soins et services pharmaceutiques aux personnes visées par l'ordonnance collective.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES

- Prescrire un médicament lorsqu' aucun diagnostic n'est requis, notamment à des fins préventives;
- Initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées;
- Surveiller la thérapie médicamenteuse.

INDICATIONS ET CONDITIONS PRÉALABLES

- Traiter un patient présentant des symptômes de conjonctivite bactérienne.

CONTRE-INDICATIONS

- **Nouveau-né de moins de 3 mois;**
- **Porteur de lentilles cornéennes;**
- Traumatisme oculaire et/ou brûlure;

- Exposition chimique;
- Présence d'un corps étranger pénétrant;
- Allergie ou intolérance aux antibiotiques autorisés;
- Cellulite autour de l'œil ou ailleurs au visage;
- Anomalie de la pupille (déplacée, fixe ou très dilatée);
- Symptômes depuis plus de 3 semaines;
- Doute quant au diagnostic (versus une autre cause d'œil rouge);
- Symptômes visuels tels qu'une atteinte de l'acuité, diplopie, douleur, photophobie, flash lumineux;
- Patient immunosupprimé;
- Chirurgie oculaire récente;
- Traitement actif d'injection intraoculaire (ex. : aflibercept (Eylea^{MD}), ranibizumab (Lucentis^{MD});
- Antécédent de glaucome à angle fermé;
- Antécédent d'iritis/sclérite/uvéïte;
- Zona actif oculaire ou ailleurs au visage;
- Céphalée sévère combinée à des nausées.

BUT(S) / INTENTION(S) THÉRAPEUTIQUE(S)

- Diminuer les symptômes de la conjonctivite et améliorer le confort du patient en 24 à 48 heures;
- Éradiquer l'infection en 5 à 7 jours;
- Limiter la contamination aux proches via un traitement rapide.

LIMITE(S) / RÉFÉRENCE(S) AU PROFESSIONNEL

- Présence de contre-indications

PROTOCOLE

1. ÉVALUATION DE LA CONDITION DE SANTÉ

Le pharmacien :

- Recherche les **signes et symptômes** évocateurs d'une conjonctivite bactérienne et élimine les autres causes d'œil rouge puis consigne l'information recueillie au dossier;
- Réfère au médecin ou à l'optométriste tout patient qui présente un/des critère(s) d'orientation (ci-haut);
- Si les signes et symptômes correspondent à la conjonctivite bactérienne, il **peut** prescrire le traitement antibiotique en se référant au tableau 1;
- À noter que les cas légers sont souvent bénins et auto-résolutifs, donc il peut être raisonnable de ne pas prescrire d'antibiotique si les symptômes sont légers ;
- Fait l'enseignement au patient et à ses proches sur le lavage des paupières et des mains (certaines conjonctivites sont très contagieuses);
- Suggère l'application de compresses chaudes 3 à 4 fois par jour;
- Suggère d'éviter le maquillage au niveau des yeux pendant l'infection;
- Avise le patient de traiter les deux yeux si les symptômes apparaissent également à l'œil sain;
- Avise le patient qu'il doit consulter un médecin, ou un optométriste, si non réponse au traitement après 48 heures, détérioration de la condition malgré un traitement approprié ou apparition de signaux d'alarme (atteinte de l'acuité visuelle, douleur, photophobie).
- Initie le traitement pharmacologique et effectue le conseil pharmaceutique d'usage.

2. TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE

Traitement de la conjonctivite bactérienne chez l'enfant de moins d'un an	
Produit	Posologie
Erythromycine - 0.5% pommade ophtalmique	Appliquer TID-QID x 7 jours
Polysporin ^{MD} gouttes ophtalmiques	Appliquer TID-QID x 7 jours
Traitement de la conjonctivite chez l'enfant de plus d'un an et chez l'adulte	
Produit	Posologie
Tobramycine - 0.3% (Tobrex ^{MD})	Mettre 1 goutte QID x 7 jours

IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT

Dr Samuel Boudreault-Larochelle (11521)

PROCESSUS DE MISE EN VIGUEUR

1. ÉLABORATION DE LA VERSION ACTUELLE

Amélie Boudreau, pharmacienne

Révision par France Poirier, pharmacienne

2. CONSULTATIONS

Aucune

3. VALIDATION PAR LA PRÉSIDENTE DU CRSP

Nom et prénom (permis)	Signature	Date
Mélissa Djadi (210518)		25 janvier 2024

4. APPROBATION DE LA VERSION ACTUELLE PAR LES PRESCRIPTEURS SIGNATAIRES

(HORS ÉTABLISSEMENT)

Nom et prénom (permis)	Signature	Date
Samuel Boudreault-Larochelle (11521)		25 janvier 2024

5. LIEN D'ACCÈS SITE WEB DU CISSS

https://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Professionnels/CRSP/Ordonnances_collectives/OC_conjonctivite_bacterienne_.pdf

OUTILS DE RÉFÉRENCE ET SOURCES

- CISSS du Bas St-Laurent, Ordonnance collective: Tx de la conjonctivite bactérienne
- Apothicaire, Covapharm, *Pathologies de l'œil rouge*, p.664-664A. Mise à jour : Ariane Du Sault, PharmD Résidente en pharmacie, Révision : François Gauthier, B.Pharm., décembre 2020 [En ligne], Consulté en ligne le 15-09-2022.
- RxTx, Choix thérapeutiques [En ligne]; Association des pharmaciens du Canada, *Œil rouge*, 2018. Consulté en ligne le 15-09-2022.
- UptoDate, *Conjunctivitis*, dernière mise à jour 02/11/2022, [En ligne]. Consulté en ligne le 15-09-2022.
- Apothicaire, Covapharm, Pathologie de l'œil rouge