

ORDONNANCE COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE

Initier un prélèvement sanguin pour dépister le diabète de type 2

Établissement : CISSS Lanaudière- GMF Matawinie : Clinique Médicale de Rawdon

Numéro de l'ordonnance collective : O.C #9

Période de validité : Janvier 2023-Janvier 2026 (3 ans)

SITUATION CLINIQUE

- Tout usager de 18 ans et plus admissible selon le résultat du score au Calculateur du risque de diabète de type 2.
- Applicable au GMF Matawinie : Clinique médicale de Rawdon

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES

Activités réservées de l'infirmier(ère) :

- Évaluer la condition physique et mentale de la personne symptomatique;
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
- Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance;
- Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes;
- Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques, incluant le monitoring et les ajustements thérapeutiques infirmiers.

PROFESSIONNELS AUTORISÉS

Infirmier (ères) de la Clinique médicale de Rawdon qui possèdent la formation, les connaissances et les compétences nécessaires.

INDICATIONS

- Procéder à l'évaluation du niveau de risque en utilisant le questionnaire canadien sur le risque de diabète suivant [FINDRISC](#) au Tableau 1;
- Proposer le dépistage par HbA1C si pertinent selon le score final obtenu.

– **Tableau 1** : Calculateur du risque de diabète de type 2 pour les cliniciens

CALCULATEUR DE RISQUE DE DIABÈTE DE TYPE 2 POUR LES CLINICIENS¹

1. Quel est l'âge de votre patient?

Entre 18 et 44 ans (0 POINT)
 Entre 45 et 54 ans (2 POINTS)
 Entre 55 et 64 ans (3 POINTS)
 65 ans et plus (4 POINTS)

2. Quel est l'indice de masse corporelle de votre patient/la catégorie d'indice de masse corporelle?
 – (Se reporter à l'annexe 1 pour voir un tableau sur l'indice de masse corporelle ou visiter le site www.bmi-calculator.net pour calculer un indice de masse corporelle.)

Normal (inférieur à 25,0 kg/m²) (0 POINT)
 En surpoids (entre 25,0 et 29,9 kg/m²) (1 POINT)
 Obèse (30,0 kg/m² ou plus) (3 POINTS)

3. Quel est le tour de taille de votre patient? La mesure du tour de taille est prise sous les côtes (en général au niveau du nombril).

HOMMES

Moins de 94 cm (moins de 37 pouces environ) (0 POINT)
 Entre 94 et 102 cm (entre 37 pouces environ et 40 pouces) (3 POINTS)
 Plus de 102 cm (plus de 40 pouces environ) (4 POINTS)

FEMMES

Moins de 80 cm (moins de 31 pouces environ) (0 POINT)
 Entre 80 et 88 cm (entre 31 pouces environ et 35 pouces) (3 POINTS)
 Plus de 88 cm (plus de 35 pouces environ) (4 POINTS)

4. Votre patient est-il physiquement actif pendant plus de 30 minutes chaque jour? Cela inclut l'activité physique au travail, pendant les loisirs ou la routine quotidienne.

Oui (0 POINT)
 Non (2 POINTS)

5. À quelle fréquence votre patient mange-t-il des légumes et des fruits?

Tous le jours (0 POINT)
 Pas tous les jours (1 POINT)

6. Votre patient a-t-il déjà pris des médicaments pour l'hypertension artérielle de manière régulière?

Non (0 POINT)
 Oui (2 POINTS)

7. A-t-on déjà remarqué que votre patient avait une glycémie élevée (p. ex. au cours d'un examen de santé, durant une maladie ou une grossesse)?

Non (0 POINT)
 Oui (5 POINTS)

8. Des membres de la famille immédiate de votre patient ou d'autres membres de sa famille ont-ils reçu un diagnostic de diabète (type 1 ou 2)? Cette question d'applique uniquement aux parents par le sang.


Non (0 POINT)
 Oui : grand-parent, tante, oncle ou cousin germain (3 POINTS) (mais pas parent, frère, sœur ou enfant)
 Oui : parent, frère, sœur ou propre enfant (5 POINTS)

..... CONTINUER À LA PAGE 2

¹Source : Questionnaire Finnish Diabetes Risk Score (score finlandais de risque du diabète) par la professeure auxiliaire Jaana Lindström, Unité de prévention du diabète, Service de prévention des maladies chroniques, Institut national pour la santé et le mieux-être, Helsinki, Finlande et le professeur Jaakko Tuomilehto, Centre de prévention vasculaire, Danube-University Krems, Krems, Autriche

- 1 -
 Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs
www.groupeetudecanadien.ca

Droit D'auteur (2012), University of Alberta



INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE

N/A

CONTRE-INDICATIONS

- Antécédents personnels de :
 - Pré diabète ou diabète;
 - Résultats de laboratoire au Dossier santé Québec (DSQ) qui ont été faits conformément au délai recommandé selon ses facteurs de risque.

PROTOCOLE MÉDICAL

Directives à l'infirmier(ère) :

- Procéder à une discussion éclairée avec l'utilisateur sur les avantages et les inconvénients du dépistage, la nature des tests, la préparation avant les examens, le mode de communication des résultats et le type de suivi si le résultat est anormal :
 - Avantages : possible diagnostic précoce du diabète;
 - Inconvénients : inconfort et anxiété associés au prélèvement sanguin;
 - Consulter le site suivant au besoin pour guider la discussion [Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs](#).
- Si l'utilisateur le désire : effectuer le dépistage du diabète de type 2 à l'aide du test suivant :
 - HbA1C.
- Assurer le suivi du résultat du prélèvement sanguin;
- Lorsque le résultat du test est anormal :
 - Référer l'utilisateur vers une IPSPL ou un médecin si :
 - Le résultat d'un test de dépistage est anormal, c'est-à-dire : Hb A1C supérieure ou égal à 6,5%.
 - Offrir un rendez-vous de suivi le cas échéant;
 - Prodiger les conseils appropriés en matière de maintien et d'adoption de saines habitudes de vie (alimentation, exercice physique, tabagisme, consommation d'alcool, etc. :
 - Les liens suivants peuvent aider à étoffer la discussion sur les habitudes de vie : <https://www.msss.gouv.qc.ca/aide-decision-app/conclusion.php?situation=pc-adulte> [Principes de base en alimentation](#), [Planifier pour faire de l'activité physique régulièrement](#)
- Les informations suivantes doivent être documentées au dossier de l'utilisateur (si applicable) :
 - L'indication clinique ayant mené à l'initiation de l'ordonnance collective;
 - La date et l'heure de la consultation;
 - Les réactions de l'utilisateur et les résultats de l'intervention;
 - L'enseignement fait à l'utilisateur et à son réseau de soutien.

LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE

- L'utilisateur doit être dirigé vers une IPSPL ou un médecin si :
 - Le résultat d'un test de dépistage est anormal c'est-à-dire : Hb A1C supérieure ou égale à 6.5%;
- Important : Pour toute urgence, problème ou question, l'infirmière doit contacter l'IPSPL ou un médecin selon la trajectoire.

COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT

L'infirmière doit diriger l'utilisateur vers l'IPSPL ou vers le médecin répondant dans certaines situations. Il est important de noter que la décision ou l'action nécessaire en dehors du champ d'exercices de l'IPSPL cette dernière aura la responsabilité de contacter un médecin identifié selon la trajectoire (GAP, GMF-U, GMF intramuros et GMF Matawinie : Clinique Médicale de Rawdon).

OUTILS DE RÉFÉRENCE ET SOURCES

CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal, (2022). Direction des soins infirmiers, Ordonnance collective: Initier des mesures de laboratoire pour dépister le diabète de type 2.

Diabète Canada (2021). Guide de référence sur les Lignes directrices de pratique clinique 2020. http://guidelines.diabetes.ca/CDACPG/media/documents/CPG/CPG_Quick_Reference_Guide_PRINT_FR_2021.pdf

Diabète Québec (2018). Réduction du risque de développer le diabète. Repéré à : <http://guidelines.diabetes.ca/CDACPG/media/documents/French%202018%20CPG/05-Reducing-the-Risk-FR.pdf>

Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs. (2012). Diabète de type 2: résumé à l'intention des cliniciens. Repéré à : <https://canadiantaskforce.ca/diabete-de-type-2-resume-a-lintention-des-cliniciens/?lang=fr>

IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR

Dre Sara Boily Md responsable professionnels GMF

IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT

Le médecin traitant si possible, sinon le médecin de garde au sans rendez-vous du Groupe de médecine de famille (GMF)

PROCESSUS DE MISE EN VIGUEUR

1. ÉLABORATION DE LA VERSION ACTUELLE

Dr Mathieu Pelletier, médecin de famille, GMF-U du Nord de Lanaudière
Samuel Boudreault, médecin de famille, GMF-U du Nord de Lanaudière
Jade Rémy, IPSPL, GMF de St-Donat

2. VALIDATION DE LA VERSION ACTUELLE

Conseillère cadre en soins infirmiers
Comité clinique de la Direction des soins infirmiers
Stéphanie Laroche inf. clinicienne
Dr Sara Boily md responsable des professionnels GMF

3. RÉVISION

Date d'entrée en vigueur : janvier 2023

Date de la dernière révision (si applicable) : N/A

Date prévue de la prochaine révision : janvier 2026

4. APPROBATION DE LA VERSION ACTUELLE

***MÉDECINS SIGNATAIRES (HORS ÉTABLISSEMENT)

Le ou les médecins signataires sont les médecins qui adhèrent à l'ordonnance collective et qui, de ce fait, donnent leur approbation et permettent à un professionnel ou à une personne habilitée d'exercer une activité professionnelle auprès des patients visés par l'ordonnance.

Hors établissement, la signature des médecins signataires est requise l'approbation de la version actuelle de l'ordonnance, sauf dans le cas d'un GMF lié à un établissement, alors seule la signature du représentant du CMDP de l'établissement est requise.

Nom et prénom	Numéro de permis	Signature	Téléphone	Télécopieur
Dre Boily, Sara	01785		450 834-2304	450 834-3345
Dr Boudrias, Louis-David	09345		450 834-2304	450 834-3345
Dr Boulerice-Turcotte, Alexis	15848		450 834-2304	450 834-3345
Dr Champagne, Mikael	01786		450 834-2304	450 834-3345
Dr Giroux, Noémie	15697		450 834-2304	450 834-3345
Dre Gélinas, Tahnée	15537		450 834-2304	450 834-3345
Dre Lepage, Catherine	03776		450 834-2304	450 834-3345
Dre Poirier-Harvey, Andréanne	14417		450 834-2304	450 834-3345
Dre Rivest, Annie	15674		450 834-2304	450 834-3345
Dre Rivest-Mcgraw, Jessica	19227		450 834-2304	450 834-3345