

## ORDONNANCE COLLECTIVE

Initier le prélèvement d'une cytologie cervicale (Pap test) et le prélèvement pour le dépistage du virus du papillome humain (VPH)

Établissement : CISSSL - GMF St-Paul

Numéro de l'ordonnance collective : O.C #5 –GMF St-Paul

Période de validité : 3 ans (octobre 2026)

### SITUATION CLINIQUE

Usagère de **plus de 21 ans**, sexuellement active ou qui l'a été dans le passé\* pour qui il y a indication de dépistage de cancer du col de l'utérus avec ou sans VPH oncogène en fonction des facteurs de risques, de son évaluation clinique et des recommandations québécoises en vigueur.

\*Inclut tout contact génital, avec ou sans pénétration auprès de partenaires masculins ou féminins.

Applicable dans un secteur de première ligne où le service est offert (ex. : GMF-U, GMF intra muros, GMF extra-muros, GAP, Clinique des jeunes, etc.)

### ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES

#### Activités réservées de l'infirmier(ère) :

1. Évaluer la condition physique et mentale de la personne symptomatique;
2. Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
3. Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance;
4. Appliquer des techniques invasives;
5. Contribuer au suivi de grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal.

#### Activités de l'infirmier(ère) auxiliaire :

1. Contribuer à l'évaluation de l'état de santé de la personne et à la réalisation du plan de soins;
2. Effectuer des prélèvements selon une ordonnance.

### PROFESSIONNELS AUTORISÉS

Infirmier(ère) du GMF St-Paul habilitée à effectuer l'examen gynécologique et les prélèvements associés ayant :

- Reçu la formation spécifique sur l'examen gynécologique;  
ET
- Réussi 10 séances de supervision par un professionnel de la santé habilité.

## INDICATIONS

### 1. Cytologie cervicale (test Pap) :

- Usagère âgée de 21 à 65 ans inclusivement, n'ayant pas subi de test Pap au cours des deux dernières années;
- Usagère âgée de plus de 65 ans, n'ayant pas obtenu un résultat normal aux deux derniers dépistages de cancer du col (test Pap) au cours des dix dernières années ou qui désire les continuer après un consentement libre et éclairé suite à une discussion avec le médecin;
- Usagère immunosupprimée\* (par médication long terme, après avoir subi une greffe, infection telle que VIH, etc.), peu importe son âge, n'ayant pas eu de test Pap au cours des 12 derniers mois;
- Usagère de moins de 30 ans avec un résultat précédent d'altération des cellules pavimenteuses de signification indéterminée (ASC-US) : contrôle de test Pap à 6 et à 12 mois.

### 2. Dépistage du virus du papillome humain (VPH) :

- Suivi d'un résultat ASC-US obtenu au test Pap précédent, chez les usagères de 30 ans et plus.

## CONTRE-INDICATIONS

- Usagère immunosupprimée : si présence d'ASC-US, ne pas faire le VPH et référer directement au médecin :
  - Si incertitude face à l'état d'immunosuppression, se référer au médecin répondant.
- Usagère de moins de 21 ans;
- Deuxième ou troisième trimestre de grossesse (sauf si le prélèvement est fait par une infirmier(ère) qui pratique dans le cadre du suivi de grossesse);
- Dépistage à la suite d'un abus sexuel (orientation selon protocole médico-légal).

Envisager de reporter le test Pap si :

- Menstruations (le sang nuit à la lecture cytologique)\*;
- Nécessité d'utiliser une grande quantité de lubrifiant (rare).

\*Attention : ne pas reporter en présence de saignement utérin anormal.

## PROTOCOLE MÉDICAL

### 1. DIRECTIVES à l'infirmier(ère) :

- Effectuer l'évaluation de la condition clinique de l'usagère;
- Initier l'ordonnance collective si l'usagère présente les critères d'initiation;
- Documenter au dossier les informations cliniques pertinentes et les interventions posées, dont l'initiation de l'ordonnance collective ainsi que la communication avec le médecin ou l'IPSPL ayant fait le diagnostic, le cas échéant;
- Renseigner l'usagère sur les avantages et les inconvénients du dépistage, la nature des tests, le mode communication des résultats et le type de suivi si le résultat est anormal;
- Effectuer la cytologie selon la méthode de soins infirmiers (MSI) « Cytologie cervicale » et acheminer le spécimen selon les directives du laboratoire;

- Effectuer le prélèvement d'échantillon cervical VPH à l'aide de la brosse à prélèvement cervical ou de la spatule en bois/cytobrosse selon la disponibilité du matériel, selon les indications et les instructions propre à chaque méthode (Annexe 1, Annexe 2) et acheminer le spécimen selon les directives du laboratoire;
- Aviser l'usagère, lorsque le résultat de cytologie cervicale indique que le spécimen est inadéquat, et lui offre de reprendre le prélèvement :
  - Si l'usagère accepte de reprendre le prélèvement, reprend le prélèvement et assure le suivi du résultat;
  - Si l'usagère refuse de reprendre le prélèvement, avise le médecin ou l'IP SPL de la situation.
- Lorsque le résultat de la cytologie est anormal, avise l'usagère et la dirige vers le médecin ou l'IP SPL afin que l'investigation soit complétée.

### LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE

Référer au médecin répondant ou à l'infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e) en soins de première ligne répondante (IP SPL) si :

- Usagère qui présente des symptômes physiques et/ou gynécologiques nécessitant une évaluation médicale en plus d'une cytologie cervicale (peut être orienté vers l'IP SPL si dans son champ d'exercice);
- Anomalie détectée à l'examen des structures génitales internes ou externes :
  - Si présence de lésions anormales au col de l'utérus, procéder au test Pap et faire voir par le médecin (délai maximal de 7 jours).
- Usagère ayant subi une hystérectomie totale (résection de l'utérus et du col de l'utérus).

### COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN RÉPONDANT

1. Transmettre tout résultat autre que « Frottis normal, absence de lésion intraépithéliale ou néoplasique » au médecin répondant ou à l'IP SPL;
2. Pour les usagères de moins de 30 ans ayant eu un résultat d'ASC-US antérieur, référer au médecin ou à l'IP SPL répondante si le test Pap de contrôle à 6 mois ou à 12 mois démontre un ASC-US ou une lésion de plus haut grade. Si les deux résultats sont normaux, reprendre le dépistage usuel;
3. Référer au médecin ou à l'IP SPL les usagères de plus de 30 ans avec un résultat d'ASC-US ayant eu un dépistage du virus du papillome humain positif.

### OUTILS DE RÉFÉRENCE ET SOURCES

American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, (2013). *Algorithms Updated Consensus Guidelines for Managing Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors*, 24 pages.

Centre d'expertise en santé de Sherbrooke, (2021). Méthodes de soins infirmiers; Cytologie cervicale

Collège des médecins du Québec, (2020). *Fiche de prévention clinique*. <http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2020-05-29-fr-fiche-de-prevention-clinique-adultes.pdf>

CISSS de Lanaudière. (2014). Ordonnance collective *Cytologie cervicale (Pap Test)*.

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, (2018). Ordonnance collective *Initier le prélèvement cytologique cervical (Pap Test) et le prélèvement pour le dépistage du papilloma humain oncogène*. [http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/DSP\\_CCSMTL\\_IE\\_091.pdf](http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/DSP_CCSMTL_IE_091.pdf)

Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventif : Cancer du col de l'utérus. Consulté en décembre 2021 au <https://canadiantaskforce.ca/portfolios/dépistage-du-cancer-du-col-de-luterus/?lang=fr>

<https://cdn.ciussnordmtl.ca/documents/Menu/Zone Professionnels/Zone Pharmaciens/OC-2019-04.pdf?1578597237>

Harer WB, Valenzuela G, Lebo D. Lubrication of the vaginal introitus and speculum does not affect Papanicolaou smears. *Obstet Gynaecol* 2002;100:887-8. 2. Amies A-M E, Miller L, Lee SK, Koutsky L. The effect of vaginal speculum lubrication on the rate of unsatisfactory cervical cytology diagnosis. *Obstet Gynaecol* 2002;100:889-92

Institut national de santé publique, (2011). Lignes directrices sur le dépistage du cancer du col utérin au Québec, 21 pages

Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, (2021). Dépistage du cancer du col de l'utérus.

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, (2012). Prise en charge colposcopique des résultats cytologiques et histologiques anormaux en ce qui concerne le col utérin, Directive clinique commune SOGC-SCC, 18 pages.

UpToDate décembre 2021 : Cervical cancer screening tests: Techniques for cervical cytology and human papillomavirus testing

UpToDate décembre 2021 Cervical cancer screening: Management of results

#### **IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR/IPSPL PRESCRIPTEUR**

Dre Annie Rivest

#### **IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT**

Dans le service de première ligne: Médecin traitant/IPS si présent ou le médecin de garde au sans rendez-vous du GMF.

#### **PROCESSUS DE MISE EN VIGUEUR**

##### **1. ÉLABORATION DE LA VERSION ACTUELLE**

Amélie Charbonneau, inf. clin., GMF-U du Nord de Lanaudière  
Dr Étienne Villeneuve, Médecin de famille, GMF-U du Nord de Lanaudière

##### **2. VALIDATION DE LA VERSION ACTUELLE**

Dr Mathieu Pelletier, Médecin de famille, GMF-U du Nord de Lanaudière  
Dr Marc Séguin, Gynécologue-Obstétricien, chef du service de gynécologie, CHDL  
Dre Brigitte Major, Gynécologue-Obstétricienne, chef du service de gynécologie, HPLG  
Josée Coderre, conseillère cadre en soins infirmiers  
Justine Tremblay, conseillère cadre en soins infirmiers  
Comité clinique de la Direction des soins infirmiers  
Annie Rivest MDF  
Stéphanie Laroche inf. Clin

**\*\*\*MÉDECINS SIGNATAIRES (HORS ÉTABLISSEMENT)**

Le ou les médecins signataires sont les médecins qui adhèrent à l'ordonnance collective et qui, de ce fait, donnent leur approbation et permettent à un professionnel ou à une personne habilitée d'exercer une activité professionnelle auprès des patients visés par l'ordonnance.

Hors établissement, la signature des médecins signataires est requise l'approbation de la version actuelle de l'ordonnance, sauf dans le cas d'un GMF lié à un établissement, alors seule la signature du représentant du CMDP de l'établissement est requise.

Nom et prénom	Numéro de permis	Signature	Téléphone	Télécopieur
Dre Beauchemin Annie	#06-145			
Dre Bérubé-Bergeron Maude	#03-553			
Dre Mylène Blanchette	#19-872			
Dr Pascal Boulanger	#03-144			
Dr Ronald Bugeaud	#09-129			
Dre Laurence Champagne	#02-992			
Dre Guylaine Chaput	#88-069			
Dre Marie-Rose Châteauvert	#86-416			
Dre Karine Coulombe	#18-548			
Dre Annick Dulong	#02-053			
Dr F.Charles Dumouchel	#17-492			
Dre Julie Gravel	#98-118			
Dre Geneviève Leclerc	#14-392			
Dr Claude Narbonne	#76-263			
Dre Cindy Proulx	#12-394			
Dr André Rachiele	#84-066			
Dre Annie Rivest	#98-164			
Dre Chantal Robitaille	<del>#93-162</del> #93 168			
Dre Chantal St-Dizier	#88-162			
Dre Jolaine Sarrazin	#02-410			

**RÉVISION**

4. Date d'entrée en vigueur : Décembre 2023

**Ordonnance collective #5 – GMF St-Paul**

Initier le prélèvement d'une cytologie cervicale (test Pap) et le prélèvement pour le dépistage du VPH