

## ORDONNANCE COLLECTIVE

### INITIER DES MESURES DIAGNOSTIQUES ET UN TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE CHEZ UNE FEMME PRÉSENTANT DES PERTES VAGINALES INHABITUELLES

Établissement : GMF Vivacité

Numéro de l'ordonnance collective : #2

Période de validité : 3 ans

#### SITUATION CLINIQUE

Femme symptomatique de 14 ans et plus :

- Femme active sexuellement, présentant des pertes vaginales inhabituelles avec ou sans microrragies prémenstruelles, post menstruelles ou saignements post coïtaux.

Partenaire sexuel asymptomatique (homme ou femme)<sup>1</sup> de 14 ans et plus :

- Personne asymptomatique identifiée comme partenaire sexuel d'une femme ayant une vaginite à *Trichomonas vaginalis* objectivée par un test en laboratoire.

Applicable dans un secteur de première ligne où le service est offert (ex. : GMF extramuros).

#### ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES<sup>2</sup>

Activités réservées de l'infirmier(ère) :

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
- Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance;
- Appliquer des techniques invasives.

#### PROFESSIONNELS AUTORISÉS

- Infirmières du GMF Vivacité qui possèdent la formation pertinente, les connaissances et les compétences nécessaires à l'application du protocole n° 628001;
- Les infirmier(ère)s ayant leur attestation du droit de prescrire dans le domaine de la santé publique Contraception-ITSS.

#### INDICATIONS

Aucune indication additionnelle.

#### CONTRE-INDICATIONS

Mêmes contre-indications que celles spécifiées pour l'application du protocole médical national, soient :

- Moins de 14 ans;
- Grossesse, allaitement;
- Immunosuppression<sup>3</sup>;
- Présence de saignements utérins anormaux, si :
  - Ménopause;
  - Persistance des saignements depuis 6 mois ou plus;
  - Antécédent d'un cancer gynécologique.

<sup>1</sup> Pour les personnes asymptomatiques identifiées comme partenaire sexuel d'une femme ayant reçu un traitement pharmacologique pour un syndrome compatible avec une cervicite, se référer au Protocole national pour le traitement d'une infection à *Chlamydia trachomatis* ou à *Neisseria gonorrhoeae* chez une personne asymptomatique.

<sup>2</sup> Le professionnel ou la personne habilitée doit s'assurer d'avoir les compétences nécessaires afin d'exécuter cette ordonnance (p. ex. : formation)

<sup>3</sup> Exemples de causes possibles d'immunosuppression (voir l'Annexe V du *Guide québécois de dépistage des ITSS*) : déficience immunitaire congénitale, leucémie, lymphome, myélome multiple, cancer non hématologique, déficit immunitaire acquis (tel que lors de l'infection par le VIH), hémodialyse, usage d'agents immunosuppresseurs.

- Présence d'une contre-indication à l'usage du médicament recommandé et aucun traitement alternatif approprié;
- Quatre épisodes ou plus de vaginose bactérienne dans les 12 derniers mois (à la suite d'une évaluation par un médecin ou un(e) infirmier(ère));
- Quatre épisodes ou plus de candidose vulvovaginale dans les 12 derniers mois (à la suite d'une évaluation par un médecin ou un(e) infirmier(ère)).

## PROTOCOLE MÉDICAL

Se référer au protocole médical national n° 628001 de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux en vigueur sur le site web au moment de l'application de cette ordonnance.

## ENSEIGNEMENT ET INTERVENTIONS PRÉVENTIVES

Se référer au Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/>

## LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION MÉDICALE OBLIGATOIRE

Au moment de l'évaluation :

- Test de grossesse urinaire positif;
- Symptômes d'une infection compliquée : douleur abdominale basse, dyspareunie profonde, atteinte d'une articulation ou altération de l'état général avec fièvre (diriger rapidement vers le médecin);
- Lésions anogénitales verruqueuses de novo compatibles avec des condylomes;
- Lésions anogénitales ulcéreuses, vésiculeuses, érosives ou pustuleuses;
- À l'examen biennuel : sensibilité abdominale basse, à une ou aux deux annexes ou à la mobilisation du col utérin, masses ou autres anomalies structurelles (diriger rapidement vers le médecin);
- Signes ou symptômes à d'autres sites exposés.

**Le tableau ci-dessous résume les prélèvements à effectuer (prélèvements préférence) avant de diriger la femme qui présente une ou plusieurs situations exigeant une consultation médicale obligatoire au moment de l'évaluation vers le médecin répondant en fonction de la présence de certaines conditions.**

CONDITIONS (PLUS D'UNE CONDITION PEUT S'APPLIQUER)	PRÉLÈVEMENTS À EFFECTUER AVANT DE DIRIGER LA FEMME VERS LE MÉDECIN RÉPONDANT
Douleur abdominale basse.	Test de grossesse urinaire.
Facteurs de risque d'une infection à <i>C. trachomatis</i> ou à <i>N. gonorrhoeae</i> et pertes vaginales inhabituelles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prélèvement vaginal (auto-prélèvement ou prélèvement par le clinicien) ou endocervical pour la recherche de <i>C. trachomatis</i> et <i>N. gonorrhoeae</i> par TAAN<sup>4</sup>, et;</li> <li>• Prélèvement endocervical pour une culture de <i>N. gonorrhoeae</i> (si un examen au spéculum est réalisé avant de diriger la personne),</li> </ul>
Facteurs de risque d'une infection à <i>C. trachomatis</i> ou à <i>N. gonorrhoeae</i> et présence de signes ou symptômes d'infection pharyngée ou rectale.	Prélèvement pharyngé ou rectal (selon la localisation des symptômes) pour la recherche de <i>C. trachomatis</i> et <i>N. gonorrhoeae</i> par TAAN et prélèvement pour une culture de <i>N. gonorrhoeae</i> .
Facteurs de risque d'une infection à <i>C. trachomatis</i> ou à <i>N. gonorrhoeae</i> et exposition pharyngée ou rectale, sans signe ou symptôme à ces sites.	Consulter l'outil <u>Prélèvements et analyses recommandés en fonction de l'infection recherchée chez les personnes asymptomatiques (dépistage)</u>
Ulcération anogénitale <sup>5</sup> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prélèvement en vue d'une analyse d'identification virale du virus herpès simplex (VHS)<sup>6</sup>, et;</li> <li>• Sérologie pour la syphilis.</li> </ul>

Pendant ou après le traitement :

- Intolérance à la médication;
- Persistance des symptômes 48 à 72 heures après la fin du traitement.

<sup>4</sup> Un prélèvement urinaire est une alternative acceptable.

<sup>5</sup> En présence d'ulcération anogénitale et de facteurs de risque d'ITSS, spécifier sur la requête de faire les analyses pour la recherche du génotype LGV (lymphogranulomatosse vénérienne) si les résultats du TAAN vaginal ou endocervical (ou urinaire, ou rectal, s'il y a lieu) sont positifs pour *C. trachomatis*.

<sup>6</sup> À moins d'avoir obtenu un résultat d'identification virale (culture ou TAAN) positif pour le VHS par le passé. Le prélèvement précoce (dès l'apparition des lésions) est primordial pour la détection du VHS.

### Résultats d'analyses microbiologiques :

- Résultat d'analyse positif au dépistage des ITSS autres que *C. trachomatis* et *N. gonorrhoeae*;
- Résultat d'analyse négatif à l'infection suspectée pour laquelle un traitement a été initié chez une femme symptomatique (si la femme est devenue asymptomatique au moment de la réception des résultats d'analyses microbiologiques, il n'est pas nécessaire de la diriger vers le médecin répondant);
- Résultat d'analyse positif à *C. trachomatis* ou à *N. gonorrhoeae* à d'autres sites exposés chez une femme ayant reçu un traitement pharmacologique pour un syndrome compatible avec une cervicite;
- Résultat d'analyse positif pour *C. trachomatis* avec un génotype associé à la lymphogranulomatose vénérienne (LGV);
- Résultat d'analyse positif à un test de contrôle de l'efficacité du traitement.

### DOCUMENTATION

Remplir le formulaire de liaison pour le pharmacien communautaire, s'il y a lieu consulter le modèle disponible dans la section Protocoles médicaux nationaux et ordonnances associées sur le site web de l'INESSS.

### COMMUNICATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT

Non applicable.

### OUTILS DE RÉFÉRENCE ET SOURCES

Élaboré avec la collaboration d'un comité consultatif formé de cliniciens et d'experts québécois. Validé par le comité d'excellence clinique en usage optimal du médicament, des protocoles médicaux nationaux et ordonnances de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

### IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR

Voir liste des médecins/ IPS signataires du GMF Vivacité

### IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT

Médecin traitant/IPSPL si présent ou le médecin de garde au sans rendez-vous du GMF.

### PROCESSUS DE MISE EN VIGUEUR

#### 1. ÉLABORATION DE LA VERSION ACTUELLE

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) : ce protocole s'appuie sur les données scientifiques et les recommandations de bonne pratique les plus récentes, bonifiées à l'aide de l'information contextuelle et du savoir expérientiel de cliniciens et d'experts québécois.

#### 2. VALIDATION DE LA VERSION ACTUELLE

Daniel Lussier, pharmacien

Comité clinique de la Direction des soins infirmiers

Comité de pharmacologie du CISSS de Lanaudière

#### 3. APPROBATION DE LA VERSION ACTUELLE

REPRÉSENTANT DU CMDP (EN ÉTABLISSEMENT)

Nom et prénom	Signature	Date
Jérôme Ouellet		2022-05-17

**RÉVISION**

1. Date d'entrée en vigueur : décembre 2023

Date de la dernière révision (si applicable) :

Date prévue de la prochaine révision : décembre 2026

Signature du médecin répondant (si applicable) :

Signature :

Date :

**APPROBATION DE LA VERSION ACTUELLE PAR LES PRESCRIPTEURS SIGNATAIRES (HORS ÉTABLISSEMENT)**

NOM ET PRÉNOM	NUMÉRO DE PERMIS	SIGNATURE
LaFrance Roxane	17286	
Cochene Karoline	102505	
Fahd Awada	152067	
Fmanouche Asma	02 657	
Vincent Carl	04963	
Noure M22lum	16067	
Myriane Kélim	16 052	
JOHANNE PASCOT	93-164	
Benoit Drouin	105267	
Julie Cloutier	93 064	
Jean-Pierre LAVERGNE	96334	
Abienaver Marmene	04587	
Sira Bette	20 875	
JOHANNA - HIGER BANI	119976	
Siham EL Housni	16863	
Caroline Desjardins	811003/2140370	
Isabelle Phaneuf	810596/2031038	
Jennifer Sigouin	810893/2082303	
Marie-Claude Giroux	8102942/2081599	
Julio Fongle	7091406	
Andrée Cacille	810270	
Julie Chabot	921570	