

## ORDONNANCE COLLECTIVE

<b>ORDONNANCE :</b> Application de shampooing kétoconazole ( <b>Nizoral 2%</b> )		<b>NUMÉRO : 1.10</b>
		<b>DATE :</b> Mai 2004
		<b>RÉVISÉE :</b> Août 2007
<b>PROFESSIONNELS VISÉS</b>	Infirmières	<b>Référence à un protocole</b>
<b>TYPE D'ORDONNANCE</b>	Ordonnance visant à <b>initier</b> la thérapie médicamenteuse.	Non

### PROFESSIONNELS HABILITÉS

- Infirmières
- L'infirmière réévalue l'efficacité du traitement après 2 semaines et 8 semaines
- Les infirmières auxiliaires sont autorisées à contribuer à l'application de cette ordonnance après évaluation par l'infirmière.

### CLIENTÈLES VISÉES

- Usagers hébergés ou hospitalisés dans les unités ou services concernés

### UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS

- Tous les centres d'hébergement et les ressources intermédiaires d'hébergement
- CHRDL :
  - Les unités de soins de longue durée psychiatriques
  - Les unités de soins de courte durée psychiatriques **adultes**

### ACTIVITÉS RÉSERVÉES

#### INFIRMIÈRES

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

#### INFIRMIÈRES AUXILIAIRES

- Contribuer à l'évaluation de l'état de santé d'une personne.
- Administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

## 1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE

- Antifongique topique pour le traitement ou la prophylaxie des infections fongiques et de dermatite séborrhéique du cuir chevelu.

## 2. CONDITION D'INITIATION

- Manifestations de symptômes d'infection fongique ou de dermatite séborrhéique du cuir chevelu déjà diagnostiquée chez l'utilisateur.

## 3. ORDONNANCE

- Appliquer le shampooing kétoconazole (**Nizoral 2%**) 5 à 10 ml sur le cuir chevelu, 2 fois/semaine pour 4 semaines

### **Si amélioration notée**

- Diminuer la fréquence d'application à 1 fois/semaine jusqu'à la disparition des symptômes.

## 4. CONDITIONS D'APPLICATION

### 4.1. Indications

- Usager identifié comme porteur de dermatite séborrhéique ou d'infection fongique du cuir chevelu, se caractérisant par un début progressif de desquamation diffuse, sèche ou grasse associée à un prurit.

### 4.2. Contre-indications

- Hypersensibilité au kétoconazole
- Présences d'une plaie au cuir chevelu

## 5. MÉTHODES

### 5.1. Précautions et directives

- Appliquer un shampooing non-médicamenteux au préalable pour déloger l'excès de sébum et de résidus ainsi que pour faciliter le mouillage du cuir chevelu.
- S'assurer d'un temps de contact d'au moins 5 minutes avec le cuir chevelu.
- Si le shampooing entre en contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau.
- Effets indésirables possibles : cheveux gras ou secs, irritation légère du cuir chevelu.

## **5.2. Procédures**

- N.A.

## **5.3. Éléments de surveillance**

- Amélioration des symptômes chez l'utilisateur.
- État de la peau du cuir chevelu

## **5.4. Complications**

- N.A.

## **5.5. Limites d'application**

- **Durée de traitement maximale:**
  - 8 semaines
- Aviser le médecin si:
  - il est impossible d'instaurer le traitement
  - il y a aggravation des symptômes ou apparition d'irritation importante.
  - aucune amélioration n'est notée après **2 semaines** de traitement.

