

ORDONNANCE COLLECTIVE

ORDONNANCE : Application de crème clotrimazole à 1% (Canesten)		NUMÉRO : 1.12
		DATE : Septembre 2004
		RÉVISÉE : Août 2007
PROFESSIONNELS VISÉS	Infirmières	Référence à un protocole
TYPE D'ORDONNANCE	Ordonnance visant à initier la thérapie médicamenteuse.	Non

PROFESSIONNELS HABILITÉS

- Infirmières
- L'infirmière réévalue l'efficacité du traitement à chaque semaine
- Les infirmières auxiliaires sont autorisées à contribuer à l'application de cette ordonnance après évaluation par l'infirmière.

CLIENTÈLES VISÉES

- Usagers hébergés ou hospitalisés dans les unités ou services concernés

UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS

- Tous les centres d'hébergement et les ressources intermédiaires d'hébergement
- CHRDL :
 - Les unités de soins de longue durée psychiatriques
 - Les unités de soins de courte durée psychiatriques **adultes**

ACTIVITÉS RÉSERVÉES

INFIRMIÈRES

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES

- Contribuer à l'évaluation de l'état de santé d'une personne.
- Administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE

- Antifongique topique pour le traitement des dermatoses.

2. CONDITION D'INITIATION

- Manifestations de symptômes de dermatose fongique déjà diagnostiqué chez l'utilisateur.

3. ORDONNANCE

- Appliquer la crème de clotrimazole à 1% (**Canesten**) 2 fois/jour sur la région atteinte.

4. CONDITIONS D'APPLICATION

4.1. Indications

- Recommandé pour les dermatoses suivantes :
 - pied d'athlète
 - candidose aux pieds, aines, aisselles, sous les seins
 - érythème fessier

4.2. Contre-indications

- Hypersensibilité au clotrimazole

5. MÉTHODES

5.1. Précautions et directives

- Nettoyer et bien assécher la région affectée avant l'application.
- Appliquer en mince couche et masser doucement la région atteinte.
- Ne pas appliquer de pansement occlusif
- Éviter tout contact avec les yeux.

5.2. Procédures

- Méthodes de soins de l'AQESSS :
«Application d'un médicament sur la peau»

5.3. Éléments de surveillance

- État de la peau au site d'application de l'antifongique topique

5.4. Complications

- N.A.

5.5. Limites d'application

- **Durée de traitement maximale:**
 - Poursuive jusqu'à 2 semaines après la disparition des symptômes
- Cesser l'emploi en présence d'aggravation des lésions.
- Aviser le médecin si:
 - il est impossible d'instaurer le traitement
 - de nouveaux symptômes de dermatose apparaissent
 - aucune amélioration notée après 7 jours

