




DENT DÉLOGÉE ACCIDENTELLEMENT



**AGIR RAPIDEMENT,
EN MOINS D'UNE HEURE,**
peut permettre de
sauver une dent
d'adulte délogée!



Dent permanente
(dent d'adulte)



Dent primaire
(dent de bébé)



Récupérer la dent et
la tenir uniquement
par la couronne.



Éviter de
toucher la
racine.



Faire mordre sur une
compresse et
consulter le dentiste.
**La dent ne peut pas
être réimplantée.**



La rincer sous
l'eau **sans
frotter.**



Essayer de
remettre la dent
en place.



Si elle ne peut être remise dans
son trou, la placer dans du **lait
froid**, ou dans la salive de l'enfant
ou, en dernier recours, dans de
l'eau.



Faire mordre dans
une compresse ou
un linge propre.



Amener l'enfant
rapidement chez le
dentiste et apporter
la dent si elle n'a pas
été réimplantée.

Le port de gants est recommandé lors d'une manipulation impliquant du sang ou de la salive.

Pour en savoir davantage, communiquer avec l'hygiéniste dentaire de l'école.

Adapté de documents produits par le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec/RLS Bécancour-Nicolet-Yamaska et par la Direction de santé publique de la Montérégie. Illustrations de l'algorithme par Cathy Voyer, CISSS de la Montérégie-Ouest/RLS Jardins-Roussillon.

Juillet 2019

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Lanaudière

Québec