

Fiche explicative des chirurgies bariatriques

CISSS de Lanaudière



Gastrectomie verticale (Sleeve)

Cette chirurgie consiste à enlever 2/3 de l'estomac, ce qui en résulte d'un estomac en forme de tube et accélère le passage des aliments vers l'intestin.



- Chirurgie laparoscopique (60-90 minutes de chirurgie en moyenne).
- Hospitalisation de 24-48 heures.
- Perte de 55-60 % **de l'excès de poids** en 1-2 ans.
- Résolution de plusieurs comorbidités.
- Suppléments vitaminiques.

Complications potentielles spécifiques

COURT TERME

- Fuite ou déhiscence (ouverture spontanée) de la ligne d'agrafes
- Saignements

LONG TERME

- Fistule (formation anormale d'une connexion entre deux organes internes)
- Sténose (rétrécissement)
- Reflux gastro-oesophagien pathologique
- Constipation

Dérivation gastrique (Bypass)

Cette chirurgie diminue le volume de l'estomac en créant une petite poche et le chirurgien ajoute une dérivation avec le petit intestin afin d'amener la nourriture plus loin.



- Chirurgie laparoscopique (90-140 minutes de chirurgie en moyenne).
- Hospitalisation de 24-48 heures.
- Perte de 60-65 % **de l'excès de poids** en 1-2 ans.
- Plus haut taux de résolution des comorbidités.
- À considérer pour patient avec reflux ou autre problème gastro-oesophagien.
- Suppléments vitaminiques.

Complications potentielles spécifiques

COURT TERME

- Fuite ou fistule aux deux sites de connexion
- Saignements

LONG TERME

- Syndrome de chasse gastrique (dumping)
- Hypoglycémie
- Sténose (rétrécissement)
- Ulcère
- Hernie interne (blocage/étranglement)
- Selle molle, flatulence

Complications communes aux deux chirurgies

COURT TERME

- Thrombose veineuse, embolie pulmonaire
- Infection superficielle ou profonde (abcès)
- Traumatisme des organes adjacents (rate, foie, intestin, etc.)
- Perte de cheveux
- Décès
- Déshydratation

LONG TERME

- Carence vitaminique, anémie, perte de cheveux
- Hernie aux sites de trocars (tiges métalliques)
- Lithiases
- Reflux gastro-oesophagien
- Perte de poids imprévisible et variable selon chaque personne
- Reprise de poids
- Besoin d'une autre chirurgie
- Détresse psychologique
- Excès de peau

Source : CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec - janvier 2021.